



ORIGINAL

Adaptación española de la versión para adultos de la Escala de Placer Interpersonal Anticipatorio y Consumatorio



Diane C. Gooding^{a,b}, Eduardo Fonseca-Pedrero^{c,d,*}, Alicia Pérez de Albéniz^c, Javier Ortuño-Sierra^c y Mercedes Paino^e

^a Departamento de Psicología, Universidad de Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, Estados Unidos de América

^b Departamento de Psiquiatría, Universidad de Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, Estados Unidos de América

^c Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad de La Rioja, Logroño, La Rioja, España

^d Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), Madrid, España

^e Departamento de Psicología, Universidad de Oviedo, Oviedo, Asturias, España

Recibido el 8 de agosto de 2015; aceptado el 18 de octubre de 2015

Disponible en Internet el 24 de diciembre de 2015

PALABRAS CLAVE

Escala de Placer Interpersonal Anticipatorio y Consumatorio; Placer interpersonal; Validación; Propiedades psicométricas; Anhedonia

Resumen

Introducción: Hasta la fecha hay una relativa escasez de medidas centradas en la evaluación de la anhedonia social que sean útiles para su uso, tanto en pacientes como en población general, y que al mismo tiempo sean adecuadas en cuanto a su contenido y brevedad. El objetivo de la presente investigación fue validar la adaptación española de la *Anticipatory and Consummatory Interpersonal Pleasure Scale* (ACIPS, «Escala de Placer Interpersonal Anticipatorio y Consumatorio») versión para adultos.

Método: La muestra total incluyó 387 participantes no clínicos (128 hombres). La media de edad fue de 21,86 años (DT = 5,11; rango 18-46 años). Se utilizaron la ACIPS y el Inventario de Depresión de Beck-II como instrumentos de medida.

Resultados: El análisis factorial exploratorio arrojó una solución de 3 factores que explicó el 79,1% de la varianza total (interacciones sociales íntimas, vinculación social en el contexto de los medios de comunicación y socialización informal). El alfa ordinal para la puntuación total de la ACIPS fue de 0,92, oscilando entre 0,76 y 0,84 para las subescalas. Los participantes que informaron de bajos niveles de síntomas depresivos tenían significativamente mayores puntuaciones en la ACIPS, en comparación con aquellos que presentaban niveles moderados-graves. La puntuación total de la ACIPS se asoció negativamente con las puntuaciones del Inventario de Depresión de Beck-II ($r = -0,22$; $p \leq 0,001$). Los participantes con historia familiar previa de esquizofrenia mostraron puntuaciones significativamente más bajas en la ACIPS, en comparación con aquellos que no tenían antecedentes familiares.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: eduardo.fonseca@unirioja.es (E. Fonseca-Pedrero).

Conclusiones: Los resultados parecen mostrar que la versión española de la ACIPS presenta unas propiedades psicométricas adecuadas. La ACIPS podría ser una herramienta útil para analizar las distintas formas en que las diferencias individuales en la capacidad hedónica de las relaciones interpersonales se relacionan con el riesgo de padecer psicopatología.

© 2015 SEP y SEPB. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Anticipatory and Consumatory Interpersonal Pleasure Scale; Interpersonal pleasure; Validation; Psychometric properties; Anhedonia

Spanish adaptation of the adult version of the Anticipatory and Consumatory Interpersonal Pleasure Scale

Abstract

Introduction: To date, there is a relative dearth of measures focusing on social anhedonia that are suitable for both patient and non-patient samples, up to date in terms of their content, and relatively brief. The goal of the present investigation was to validate the Spanish translation of the Anticipatory and Consumatory Interpersonal Pleasure Scale (ACIPS)-Adult version for use with Spanish-speaking populations.

Method: The total sample included 387 nonclinical individuals from Spain (128 males). The mean age was 21.86 years ($SD = 5.11$; range 18-46 years). The ACIPS and the Beck Depression Inventory-II were used.

Results: Exploratory factor analysis yielded a 3-factor solution which explained 79.1% of the variance (intimate social interactions, social bonding in the context of media/communications, and casual socialization). The total ACIPS showed good internal consistency, estimated with ordinal alpha; it was 0.92, ranging from 0.76 to 0.84 for the subscales. The participants who reported a minimal to low level of depressive symptoms had significantly higher total ACIPS scores than the participants who reported experiencing moderate to severe levels of depressive symptoms. Total scores on the ACIPS were negatively associated with scores on the Beck Depression Inventory-II ($r = -0.22$, $p \leq .001$). Participants with a family history reported significantly lower total ACIPS scores than those without a family history of schizophrenia.

Conclusions: The present results showed that the Spanish version of the ACIPS scores had adequate psychometric properties. The ACIPS may be useful in terms of helping to elucidate the ways in which individual differences in hedonic capacity for social and interpersonal relationships relates meaningfully to risk for various forms of psychopathology.

© 2015 SEP y SEPB. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

A pesar de la naturaleza generalmente gratificante de las relaciones sociales, la capacidad hedónica para las interacciones interpersonales se encuentra distribuida de manera continua en la población general. Es decir, aunque la mayoría de la población disfruta interactuando con otros, un pequeño grupo de individuos no clínicos no experimentan placer en las relaciones sociales. De esta manera, la anhedonia social, esto es, la reducida capacidad para experimentar placer en las relaciones sociales e interpersonales, puede considerarse distribuida en un continuo¹⁻³. La anhedonia social es una característica común en una amplia variedad de trastornos psiquiátricos, incluyendo la depresión mayor, la esquizofrenia y los trastornos del espectro esquizofrénico, los trastornos de estrés postraumático, el autismo y los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, las personas con trastorno depresivo mayor experimentan frecuentemente estados relativos de anhedonia social⁴. Estudios previos también indican que la anhedonia social, que a menudo caracteriza a la esquizofrenia y a los trastornos del espectro esquizofrénico, es un rasgo

estable^{4,5}. Por lo tanto, es importante y útil disponer de instrumentos de medida adecuados para evaluar todo el continuo de la experiencia de placer social e interpersonal, es decir, desde niveles que podrían ser observados en poblaciones no clínicas hasta niveles clínicos observados en diferentes formas de psicopatología.

Hasta la fecha, hay una relativa escasez de medidas centradas en la evaluación de la anhedonia social que sean adecuadas para su uso tanto en muestras clínicas como no clínicas, que al mismo tiempo estén actualizadas en cuanto a su contenido y que sean relativamente breves. La *Anticipatory and Consumatory Interpersonal Pleasure Scale* (ACIPS, «Escala de Placer Interpersonal Anticipatorio y Consumatorio»)^{6,7} satisface todos los criterios mencionados. Asimismo, la ACIPS tiene una considerable utilidad clínica. En primer lugar, proporciona una medida indirecta del constructo de anhedonia social que, en su forma más extrema, se ha observado en diversos trastornos clínicos como la depresión, los trastornos del espectro esquizofrénico y los trastornos del espectro autista. Las puntuaciones de la ACIPS distinguen entre grupos psiquiátricos y no psiquiátricos de pacientes, mostrando estos últimos puntuaciones medias

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/4191057>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/4191057>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)