

GACETA SANITARIA a primera vista

Julio-agosto 2015

EDITORIAL

Isabel Goicolea, Elena Aguiló y Juan Madrid

¿Es posible una atención primaria «amigable para las/los jóvenes» en España?

Las conductas saludables iniciadas durante la juventud (entre los 15 y los 24 años de edad) es más probable que se mantengan durante la edad adulta. Este editorial analiza los servicios de salud amigables para jóvenes, entendidos como accesibles, aceptables, equitativos, apropiados y efectivos para los diversos grupos de jóvenes. De entre todos los modelos, este artículo se centra en los servicios integrados dentro de los establecimientos de salud. Estos servicios deben basarse en políticas no restrictivas, responder a las necesidades de las/los jóvenes con confidencialidad y sin prejuicios, fortalecer la participación juvenil, promover el diálogo con la comunidad, coordinarse con otros servicios e implementar actividades preventivas y comunitarias fuera de los servicios. Sin embargo, las personas jóvenes son más renuentes que las adultas a acudir a los servicios sanitarios, y estos, a su vez, tienden a asignar menos prioridad a la atención de jóvenes. Las/los expertas/os sugieren medidas como, por ejemplo, adaptar los horarios y el sistema de citas, asegurar la privacidad desde el momento de la recepción, visibilizar las políticas de confidencialidad, confirmar que las/los profesionales están formados en salud de adolescentes y jóvenes, o asegurar actitudes «amigables» como no juzgar, la empatía y el respeto a la autonomía.

ORIGINAL

Pilar Bas-Sarmiento, Martina Fernández-Gutiérrez,
M^a Jesús Albar-Marín y Manuel García-Ramírez

Percepción y experiencias en el acceso y el uso de los servicios sanitarios en población inmigrante

Estudio cualitativo mediante grupos focales realizado con 51 inmigrantes de 11 nacionalidades en Campo de Gibraltar que tiene como objetivo identificar y describir las necesidades y los problemas percibidos por esta población en relación con el acceso y la utilización de los servicios de salud. Las respuestas desplegadas ante los problemas de salud y la forma de acceder al sistema sanitario son distintas en función de algunas características sociodemográficas, como la cultura de origen, el tiempo de estancia y el estatus económico. En general, la población inmigrante utiliza principalmente la asistencia sanitaria a demanda cuando presentan problemas de salud, y quedan relegados los servicios de promoción y prevención de la salud. Las necesidades de alfabetización en salud detectadas se relacionan sobre todo con el dominio del idioma y el funcionamiento del sistema sanitario. Se recomienda, por tanto, fomentar intervenciones destinadas a potenciar la alfabetización en salud de la población inmigrante, que atiendan a la diversidad, tengan en cuenta el tiempo de estancia y partan de una metodología de acción-participación.

ORIGINAL

Constanza Jacques Aviñó, Patricia García de Olalla, Elia Díez,
Silvia Martín y Joan A. Caylà

Explicaciones de las prácticas sexuales de riesgo en hombres que tienen sexo con hombres

Este estudio cualitativo realizado con una muestra de 13 hombres que tenían sexo con hombres, seronegativos, contactados en saunas gay de Barcelona, busca conocer las explicaciones sobre prácticas

sexuales de riesgo y la percepción del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y establecer propuestas de intervención para prevenir las infecciones por el VIH. Las prácticas sexuales de riesgo se atribuyeron a una masculinidad asociada a una alta necesidad sexual, a determinados lugares de intercambio sexual (como saunas, fiestas privadas y clubs), al consumo de drogas y al deseo de experimentar con el riesgo y la propia sexualidad. La infección por el VIH se percibía como una enfermedad normalizada, aunque contraerla se asocia a vergüenza y culpa. Entre las propuestas de intervención sugeridas se encuentran concienciar sobre lo que significa vivir con el VIH, generar más alarma social, incorporar las nuevas tecnologías en la prevención y aumentar las acciones en lugares de encuentro gay.

ORIGINAL

Inmaculada León-Gómez, Concepción Delgado-Sanz,
Silvia Jiménez-Jorge, Víctor Flores, Fernando Simón,
Diana Gómez-Barroso, Amparo Larrauri y Salvador de Mateo Ontañón

Exceso de mortalidad relacionado con la gripe en España en el invierno de 2012

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria en España y el programa *European monitoring of excess mortality for public health action* detectaron un exceso de mortalidad en España en febrero y marzo de 2012. El objetivo de este trabajo es estudiar el papel que puede atribuirse a la gripe como factor de sobremortalidad en ese periodo. En febrero y marzo de 2012 se detectó un exceso de mortalidad de 8110 y 10.872 defunciones. El modelo que estima la mortalidad atribuible a la gripe identificó, en la temporada 2011-2012, el máximo porcentaje (97%) de defunciones atribuibles a la gripe en mayores de 64 años con respecto al total de la mortalidad asociada a la gripe (13.822 defunciones). La tasa de excesos de defunciones por gripe y neumonía y causas respiratorias en mayores de 64 años fue máxima durante esa temporada: 18,07 y 77,20 defunciones por cada 100.000 habitantes, respectivamente. El estudio, por tanto, muestra que la gripe pudo ser uno de los principales factores que contribuyó al exceso de mortalidad observado en el invierno de 2012 en España.

ORIGINAL

Maria Cruz Rodríguez-Jareño, Emilia Molinero, Jaume de Montserrat,
Antoni Vallés y Marta Aymerich

How much do workers' health examinations add to health and safety at the workplace? Occupational preventive usefulness of routine health examinations

Pese a la ausencia de evidencia a favor, la realización de exámenes de salud sistemáticos a las/los trabajadoras/es, sobre todo iniciales y periódicos, es una práctica extendida en muchos países y conlleva una asignación importante de recursos. En España se realizan dentro de un sistema de vigilancia de la salud laboral teóricamente específico. Este trabajo busca determinar su utilidad preventiva ocupacional desde la perspectiva de las/los profesionales sanitarias/os de salud laboral. Tras realizar una encuesta a 285 miembros de la Sociedad Catalana de Seguridad y Medicina del Trabajo, el 70% consideró que el sistema de vigilancia de salud no es coste-efectivo y no contribuye a mejorar el sistema de prevención de riesgos laborales. También se identificaron deficiencias en la especificidad y la base científica de los exámenes, en la calidad de la vigilancia colectiva y en la derivación a las mutuas de casos sospechosos de patología laboral para su diagnóstico y tratamiento. La opinión fue significativamente más negativa para varios ítems entre la comunidad médica que en

la de enfermería, y entre los grupos de profesionales de prevención ajenos que en los propios. Los resultados sugieren una revisión de los exámenes de salud dentro del sistema de vigilancia de salud para asegurar el cumplimiento de su objetivo preventivo laboral.

ORIGINAL

*Luis Herrero Tabanera, José Jesús Martín Martín
y M^a del Puerto López del Amo González*

Eficiencia técnica de los hospitales públicos y de las empresas públicas hospitalarias de Andalucía

Estudio realizado en 32 hospitales públicos de Andalucía entre 2005 y 2008 para evaluar su eficiencia técnica. Primero se calcularon los índices de eficiencia técnica de los hospitales mediante análisis envolvente de datos y la evolución de la eficiencia con el índice de Malmquist. Los resultados se compararon por calidad percibida y se realizó un análisis de sensibilidad mediante un modelo auxiliar y *bootstrapping*. En una segunda etapa se realizó un análisis bivariado entre la eficiencia de los hospitales y su tipo de organización. Los resultados muestran que las empresas públicas fueron más eficientes que los hospitales tradicionales en todos los años del estudio (más de un 10% de media). Sin embargo, se observa un proceso de convergencia entre ambos tipos de organizaciones, ya que mientras que los hospitales tradicionales aumentaron ligeramente su eficiencia en el periodo, un 0,50%, las empresas públicas sufrieron una disminución en su eficiencia de más de un 2%. La principal causa de la superior eficiencia de las empresas públicas puede radicar en su mayor flexibilidad laboral y presupuestaria.

ORIGINAL

Áurea Morillo-García, Josefa M. Aldana-Espinal, Antonio Olry de Labry-Lima, Raquel Valencia-Martín, Reyes López-Márquez, Mercedes Loscertales-Abril y Manuel Conde-Herrera

Hospital costs associated with nosocomial infections in a pediatric intensive care unit

El objetivo de este estudio es estimar el coste adicional atribuible a las infecciones nosocomiales en una Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos de tercer nivel, en 2008-2009, y sus factores asociados. La incidencia de infecciones nosocomiales fue del 11,3% entre los 443 pacientes estudiados. La diferencia de las medianas en el coste total fue de 30.791,4 € por paciente entre los grupos con y sin infección nosocomial. El coste mediano de la estancia de pacientes con infección nosocomial fue casi ocho veces mayor que el coste mediano de pacientes sin infección nosocomial. En pacientes con infección nosocomial, el coste asociado a procedimientos fue más alto que el de antibióticos, nutrición enteral y parenteral, y pruebas de imagen. Los factores asociados con un mayor coste fueron la presencia de infección nosocomial, la cirugía cardiovascular, el tipo de ingreso urgente, el mayor índice pronóstico de mortalidad al ingreso y la presencia de inmunosupresión. Por el contrario, las/los pacientes de mayor edad y aquellas/os ingresadas/os por cirugía presentaron un menor coste. La prevención de estas infecciones mediante intervenciones específicas, por tanto, podría resultar coste-efectiva, reduciendo en sistemas de salud más seguros.

ORIGINAL BREVE

*Pedro Favila Escobio, Joana Ribas, Marta G. Morillo,
Ginna Rodríguez-Ramírez, Jeronima Vicens-Ferrer y Magdalena Esteve*

Prevalence of Chagas disease in the Bolivian population of Majorca (Spain)

La enfermedad de Chagas es una de las enfermedades tropicales con mayor morbilidad e impacto socioeconómico en el continente americano. El estudio pretende estimar la seroprevalencia de la infección por *Trypanosoma cruzi* en personas bolivianas residentes

en Mallorca. Para ello, se reclutó a 251 personas bolivianas adultas asignadas a médicos de familia de dos centros de salud de Mallorca. La seroprevalencia fue del 19,1%, siendo mayor en quienes procedían de provincias endémicas, áreas rurales, casas de adobe o cuya madre o algún familiar había sufrido la infección. El trabajo evidencia una alta prevalencia en las personas bolivianas residentes que se asocia con los factores de riesgo ya establecidos.

ORIGINAL BREVE

*Francisco Caravaca-Sánchez, Cristóbal Sánchez-Alcaraz Martínez,
Eduardo Osuna, María Falcón Romero y Aurelio Luna*

Implicaciones del consumo de sustancias psicoactivas sobre la salud de hombres privados de libertad

Con una muestra de 425 internos de cuatro centros penitenciarios de Castilla-La Mancha, este estudio describe las frecuencias de consumo de alcohol y otras drogas, así como de diferentes tipos de victimización en la población reclusa. Para ello se distribuyó una encuesta de victimización anónima entre los reclusos. Las agresiones verbales se presentan como las más comunes, con un 41,4%, y en el otro extremo se encuentra la victimización sexual, con un 7,8%. La sustancia más consumida es el cannabis, con un 40,2% de consumidores en el mes previo, seguida del alcohol (37,1%), la cocaína (28%) y los psicotrópicos (17,9%). Se encuentra una asociación estadísticamente significativa entre la victimización y el consumo de sustancias en prisión. Resulta necesario, por tanto, un mayor estudio para el planteamiento de medidas preventivas y mejorar la vida en la cárcel.

ORIGINAL BREVE

José M. Martínez-Sánchez, Marcela Fu, Montse Ballbè, Juan Carlos Martín-Sánchez, Esteve Saltó y Esteve Fernández

Conocimiento y percepción de la nocividad del cigarrillo electrónico en población adulta de Barcelona

La prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos en España es del 6,5%. Este trabajo describe el conocimiento y la percepción de su nocividad en una población de 736 personas adultas de Barcelona en 2013-2014. El 79,2% de las/los participantes manifestó conocer el cigarrillo electrónico. El grado de conocimiento medio fue de 4,4 puntos sobre 10, con diferencias estadísticamente significativas según la edad, el nivel de estudios, el consumo de tabaco y la dependencia de la nicotina. La mayoría de las/los participantes conocieron los e-cigarrillos a través de los medios de comunicación clásicos (57,8%). El 47,2% opinaba que son menos nocivos que los convencionales. La publicidad de los e-cigarrillos en los medios de comunicación, a tenor de estos resultados, debería regularse debido a la escasa evidencia científica sobre su utilidad y sus posibles efectos adversos.

ORIGINAL BREVE

*Marina Beléndez Vázquez, Iñaki Lorente Armendáriz
y Mercedes Maderuelo Labrador*

Estrés emocional y calidad de vida en personas con diabetes y sus familiares

La experiencia de vivir a diario con la diabetes puede incidir negativamente en la calidad de vida de las personas con esta enfermedad y de sus familiares. Este trabajo presenta los resultados del estudio DAWN2 para España en relación con la calidad de vida y el bienestar emocional de las personas con diabetes y sus familiares. La muestra española del estudio DAWN2 es de 502 pacientes y 123 familiares. El análisis muestra que el 13,9% de las/los pacientes presenta riesgo de una posible depresión. Por otro lado, una de cada dos personas con diabetes y el 45,5% de las/los familiares refieren un alto grado de estrés emocional asociado a la diabetes. El impacto psicosocial de la diabetes alcanza también, por tanto, a las familias.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/1073149>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/1073149>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)