



CASO CLÍNICO

Rara apresentação de aneurisma sífilítico roto de aorta com pseudoaneurisma



Israel Nilton de Almeida Feitosa*, Magda Dantas Leite Figueiredo, Lucia de Sousa Belem, Antônio Wilon Evelin Soares Filho

Departamento de Ecocardiografia, Hospital do Coração de Messejana, Fortaleza, Ceará, Brasil

Recebido a 18 de janeiro de 2015; aceite a 21 de março de 2015
Disponível na Internet a 21 de outubro de 2015

PALAVRAS-CHAVE

Aneurisma;
Pseudoaneurisma;
Massa torácica;
Sífilis

KEYWORDS

Aneurysm;
Pseudoaneurysm;
Chest mass;
Syphilis

Resumo Relata-se o interessante caso de uma rara forma de apresentação de rotura da aorta ascendente com formação de um pseudoaneurisma, diagnosticado por manifestar-se como uma grande massa tumoral na superfície do tórax com evolução clínica de, aproximadamente, oito meses. Provas sorológicas foram positivas para sífilis. Ecocardiografia e angiotomografia foram fundamentais na confirmação diagnóstica e orientação terapêutica.

Sífilis cardiovascular é uma entidade rara após a descoberta da penicilina. Dilatação aneuris-mática rota da aorta com formação de um pseudoaneurisma é uma complicação potencialmente fatal.

O paciente evoluiu sem intercorrências no período pós-operatório, recebendo alta hospitalar dias após o procedimento cirúrgico.

© 2015 Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos os direitos reservados.

Rare presentation of ruptured syphilitic aortic aneurysm with pseudoaneurysm

Abstract We report the interesting case of a rare form of presentation of rupture of the ascending aorta with formation of a pseudoaneurysm, diagnosed following the development of a large mass on the surface of the chest over a period of about eight months. Serological tests were positive for syphilis. Echocardiography and computed tomography angiography were essential to confirm the diagnosis and therapeutic management.

Cardiovascular syphilis is a rare entity since the discovery of penicillin. Rupture of an aortic aneurysm with formation of a pseudoaneurysm is a potentially fatal complication.

The postoperative period was uneventful and the patient was discharged from hospital within days of surgery.

© 2015 Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

* Autor para correspondência.

Correio eletrónico: inafeitosa@hotmail.com (I.N. de Almeida Feitosa).

Introdução

O pseudoaneurisma aórtico é uma patologia grave e potencialmente fatal, caracterizado pela coleção de sangue e tecido conjuntivo por fora da parede do vaso. Decorre da ruptura de, pelo menos, uma das camadas da parede aórtica, contida pelas restantes ou por estruturas mediastínicas adjacentes, determinando a formação de um saco aneurismático extraluminal que comunica a verdadeira luz através de um colo estreito.

Os autores descrevem o interessante caso de uma rara forma de apresentação de ruptura da aorta ascendente com formação de um pseudoaneurisma, diagnosticado por manifestar-se como uma grande massa tumoral na superfície do tórax com evolução clínica de, aproximadamente, oito meses. Ecocardiografia e angiotomografia foram fundamentais na confirmação diagnóstica e orientação terapêutica.

Relato do caso

Homem de 54 anos, branco, resolve procurar auxílio médico por queixar-se de tumoração em crescimento no seu peito, associada a dor torácica dorsal com cerca de oito meses de evolução. A dor possuía caráter latejante, associada à cefaleia, sem irradiação, inicialmente leve (com progressão para moderada intensidade) e melhora após uso de ibuprofeno. Referia ainda disfagia de condução e negava demais sintomas, inclusive trauma torácico, forte dor aguda ou infecção prévia. Cessou tabagismo e etilismo após início do quadro clínico (passado de grande ingestão diária de álcool). Desconhecia outras comorbidades. Ao exame físico, encontrava-se em bom estado geral, eupneico, normocorado, chamando atenção a presença de grande massa em região anterior esquerda do tórax, com cerca de quinze centímetros de diâmetro e pulsátil à palpação (Figura 1). Frequência cardíaca e pressão arterial estavam normais. Ausência de alterações neurológicas. Não havia alterações dos pulsos. Ausculta cardíaca normal. Redução do murmúrio vesicular em base do hemitórax esquerdo.

Após internação hospitalar, o paciente foi medicado com betabloqueador por via oral (propranolol). Realizou radiografia de tórax em incidência pósterio-anterior, demonstrando alargamento mediastinal e elevação da base

do hemitórax à esquerda (sugerindo eventração diafragmática). O eletrocardiograma era normal.

Realizou ecocardiografias transtorácica (Figura 1) e transesofágica que revelaram dilatação aneurismática envolvendo a porção distal da aorta ascendente e arco aórtico, com 93 mm em seu maior diâmetro, além de imagem com aspeto de perda de continuidade da parede aórtica, compatível com rotura, havendo contensão local do fluxo sanguíneo determinada por extensa área extraluminal de ecogenicidade heterogênea junto à parede aórtica (possivelmente trombos murais) formando um pseudoaneurisma. Um dos trombos estava impactado no colo do pseudoaneurisma, sendo identificada a passagem de pequeno fluxo ao mapeamento de cores. A aorta ascendente tubular apresentava dilatação de sua porção distal (55 mm de diâmetro) e os demais segmentos aórticos apresentavam fluxometria e diâmetros normais. Em arco aórtico, observava-se imagem compatível com hematoma intramural em formato de crescente, medindo aproximadamente 26 mm de profundidade.

O paciente foi submetido à angiotomografia de tórax (Figura 2) que revelou significativa lesão aneurismática comprometendo o segmento ascendente da aorta torácica e arco (medindo aproximadamente 12 × 93 mm e com importante alargamento do mediastino ântero-superior) e sinais de rotura, evidenciada por extravasamento de conteúdo hipodenso extratorácico e abaulamento cístico do tórax. Evidenciava-se ainda trombo parietal com espessura de 24 mm. O aneurisma ocasionava compressão significativa sobre o tronco da artéria pulmonar, rechaçando-o posteriormente.

No pré-operatório, o cateterismo esquerdo e a aortografia revelavam irregularidades da artéria descendente anterior e artéria circunflexa, sem lesões obstrutivas, e com evidência de aneurisma em aorta ascendente comprimindo o tronco braquiocefálico e a artéria carótida comum esquerda.

Após a confirmação diagnóstica pelos exames de imagem, o paciente foi submetido à intervenção cirúrgica. Empregou-se circulação extracorpórea e hipotermia profunda, esternotomia mediana, corrigindo-se o aneurisma roto da aorta ascendente e do arco através da interposição de enxerto vascular sintético, havendo reimplante e redirecionamento de fluxo do tronco braquiocefálico e da artéria carótida esquerda.




Figura 1 À esquerda: massa em região anterior do tórax. À direita: ecocardiografia transtorácica mostrando grande dilatação aneurismática do arco aórtico, um saco aneurismático extraluminal (pseudoaneurisma) e um estreito colo com fluxo contido por imagem compatível com trombo.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/1125702>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/1125702>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)