

Évaluez-vous !

Cette formation doit se faire progressivement. Chacun doit trouver le moyen qui lui correspond. Proposez la formation aux membres de l'équipe officinale et à vos stagiaires. Un travail collégial peut aussi être réalisé lors de sessions de travail.

♦ Évaluation diagnostique

Étape 1 – Répondez aux questions, puis attribuez-vous une note sur 25 points (1 point par réponse juste). Cette note vous renvoie à la grille d'appréciation.

Étape 2 – Améliorez vos connaissances en travaillant la formation dans ce module.

Étape 3 – Réévaluez-vous en vous attribuant une seconde note. Travailler à nouveau ce module jusqu'à l'obtention d'une note comprise entre 22 et 25 points.

Étape 4 – Laissez de côté ce module pendant quelques semaines, puis réévaluez-vous. Répétez une évaluation sur ce module deux ou trois fois par an.

♦ Évaluation formative

Étape 1 – Lisez et travaillez directement à votre rythme le module de formation.

Étape 2 – Répondez aux questions, puis attribuez-vous une note sur 25 points.

Étape 3 – Continuez dans le système travail/évaluation jusqu'à ce que votre appréciation soit maximale.

♦ Sans évaluation

Si les questions de la grille d'évaluation vous décourage, lisez et travaillez périodiquement et à votre rythme le module de formation, sans réaliser d'évaluation.

♦ Règlement de la notation

Chaque question est notée sur 1 point. Pour vous attribuer 1 point, il faut avoir répondu parfaitement aux questions. Si la réponse comporte 3 cases à cocher, il faut avoir coché les 3 cases pour s'attribuer 1 point : si vous n'en avez coché que 2, la note attribuée à cette question est 0. Entre 22 et 25 points : vos connaissances sont excellentes.

Entre 18 et 21 points : vous avez de très bonnes connaissances, seules quelques améliorations sont nécessaires.

Entre 15 et 17 points : vos connaissances sont plutôt bonnes, vous pouvez les améliorer.

Entre 12 et 14 points : assez bien, mais vous pouvez faire mieux.

Entre 9 et 11 points : moyen, la formation vous apportera les compléments.

Entre 6 et 8 points : vos connaissances sont insuffisantes, la formation est nécessaire.

Entre 3 et 5 points : vous avez des lacunes importantes, travaillez.

Entre 0 et 2 points : très insuffisant, travaillez activement cette formation.

Jacques BUXERAUD

Professeur des Universités,
professeur de chimie
thérapeutique

Faculté de pharmacie,
2 rue du Docteur-Marcland,
87025 Limoges cedex,
France

1. Quelle est la bonne posologie pour Xalkori® ?

- A ☐ 250 mg deux fois par jour en continu
- B ☐ 250 mg une fois par jour pendant quinze jours par mois
- C ☐ 50 mg par jour en continu
- D ☐ 50 mg deux fois par jour en continu
- E ☐ 50 mg un jour sur deux

2. Quelle est ou quelles sont les bonnes affirmations à propos de Xalkori® ?

- A ☐ Indiqué dans le cancer du pancréas
- B ☐ Indiqué dans le cancer bronchique non à petites cellules *anaplastic lymphoma kinase-positive* (ALK+)
- C ☐ Produit injectable
- D ☐ Présenté sous la forme de gélules pour la voie orale
- E ☐ Peut générer un allongement de l'intervalle de systole ventriculaire corrigé (QTc)

3. Quel est le dosage des comprimés de Jakavi® ?

- A ☐ 5 mg
- B ☐ 10 mg
- C ☐ 15 mg
- D ☐ 20 mg
- E ☐ 25 mg

4. Quelle est ou quelles sont les bonnes affirmations à propos de Jakavi® ?

- A ☐ Indiqué dans le traitement de la myélofibrose
- B ☐ Indiqué dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique
- C ☐ Les effets indésirables les plus fréquents sont une thrombopénie, une anémie et une neutropénie
- D ☐ Peut augmenter les transaminases hépatiques
- E ☐ Peut générer un allongement de l'intervalle de systole ventriculaire corrigé (QTc)

Adresse e-mail :
jacques.buxeraud@unilim.fr
(J. Buxeraud).

5. Quelle est la dénomination commune internationale de Zelboraf® ?

- A ☐ Crizotinib
- B ☐ Ruxolitinib
- C ☐ Vémurafénib
- D ☐ Vandétanib
- E ☐ Imatinib

6. Quelle est ou quelles sont les bonnes affirmations à propos de Zelboraf® ?

- A ☐ Disponible sous forme de comprimé à 240 mg
- B ☐ Disponible sous forme de comprimé à 50 mg
- C ☐ Des réactions graves d'hypersensibilité, dont des cas d'anaphylaxie, ont été rapportées
- D ☐ Peut augmenter les transaminases hépatiques
- E ☐ Peut générer un allongement de l'intervalle de systole ventriculaire corrigé (QTc)

7. Quelle est l'indication de Caprelsa® ?

- A ☐ Cancer du poumon
- B ☐ Myélofibrose
- C ☐ Cancer de la thyroïde
- D ☐ Cancer du côlon
- E ☐ Cancer du pancréas

8. Sous quelle forme la spécialité Signifor® est-elle disponible ?

- A ☐ Solution injectable sous-cutanée à 0,3 mg par ampoule
- B ☐ Solution injectable sous-cutanée à 0,6 mg par ampoule
- C ☐ Solution injectable sous-cutanée à 0,9 mg par ampoule
- D ☐ Comprimé à libération prolongée à 0,3 mg
- E ☐ Comprimé à libération prolongée à 0,9 mg

9. Quelles sont les bonnes affirmations à propos de Signifor® ?

- A ☐ Sa dénomination commune internationale est lanréotide
- B ☐ Sa dénomination commune internationale est pasiréotide
- C ☐ Médicament indiqué dans la maladie de Cushing
- D ☐ Médicament indiqué dans l'insuffisance surrénalienne
- E ☐ Une lithiase biliaire peut survenir fréquemment avec le pasiréotide

10. Quelle est la bonne composition de Pylera® ?

- A ☐ Bismuth, métronidazole, tétracycline
- B ☐ Bismuth, clarithromycine, métronidazole
- C ☐ Bismuth, tétracycline, clarithromycine
- D ☐ Bismuth, amoxicilline, métronidazole
- E ☐ Bismuth, métronidazole, oméprazole

11. Quelle est la bonne posologie pour Pylera® ?

- A ☐ Deux gélules matin, midi et soir
- B ☐ Trois gélules matin, midi, dîner et coucher
- C ☐ Une gélule matin, midi et soir
- D ☐ Trois gélules matin, midi et dîner
- E ☐ Quatre gélules le matin et quatre le soir

12. Par quoi l'absorption de Pylera® peut-elle être réduite ?

- A ☐ Le jus de pamplemousse
- B ☐ Les suppléments à base de fer
- C ☐ Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
- D ☐ Les anti-acides contenant de l'aluminium
- E ☐ Le millepertuis

13. Quelles sont les bonnes affirmations à propos de Fampra® ?

- A ☐ Médicament sous la forme de comprimés à libération prolongée
- B ☐ Médicament sous la forme de stylo injecteur
- C ☐ Indiqué dans la sclérose en plaques
- D ☐ Indiqué dans la polyarthrite rhumatoïde
- E ☐ Indiqué dans la spondylarthrite ankylosante

14. Quelle est la bonne posologie pour Eylea® dans la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ?

- A ☐ Une injection mensuelle pendant trois mois
- B ☐ Une injection bimensuelle pendant trois mois
- C ☐ Une injection tous les deux mois pendant un an
- D ☐ Une injection tous les trois mois pendant un an
- E ☐ Une injection deux fois par an pendant deux ans

15. Quels effets systémiques peuvent provoquer les corticoïdes inhalés comme Alvesco®, notamment en cas d'utilisation prolongée et à fortes doses ?

- A ☐ Inhibition de la fonction surrénalienne
- B ☐ Pneumopathie interstitielle diffuse
- C ☐ Retard de croissance chez les enfants et les adolescents
- D ☐ Diminution de la densité minérale osseuse
- E ☐ Cataracte et glaucome

16. Quelle maladie le nouveau médicament Kalydeco® est-il destiné à traiter ?

- A ☐ La pneumopathie interstitielle diffuse
- B ☐ La mucoviscidose
- C ☐ La sclérose en plaques
- D ☐ L'insuffisance rénale
- E ☐ La maladie de Cushing

17. Quelles sont les bonnes affirmations à propos de Priligy® ?

- A ☐ Sa dénomination commune internationale est paroxétine
- B ☐ Sa dénomination commune internationale est dapoxétine
- C ☐ Permet de traiter l'éjaculation précoce
- D ☐ Permet de traiter les dysfonctions érectiles
- E ☐ Posologie d'un comprimé par jour au long cours

18. Qu'est-ce que Toviaz® ?

- A ☐ Un antiseptique urinaire
- B ☐ Un antispasmodique urinaire
- C ☐ Un antibiotique urinaire de la famille des fluoroquinolones
- D ☐ Un nouvel anti-inflammatoire
- E ☐ Un chélateur du potassium

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/2475551>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/2475551>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)