

Le traitement de la gale

La gale ne guérissant pas spontanément, le patient doit être pris en charge dès le diagnostic établi. Aux traitements locaux conventionnels vient s'ajouter un traitement *per os* particulièrement adapté aux personnes vivant en collectivité. Dans les cas où une complication apparaît, des soins complémentaires doivent être prescrits. La conduite à tenir doit être correctement expliquée au patient.

© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

The treatment of scabies. As scabies does not clear up on its own, the patient must be treated as soon as the diagnosis is made. In addition to conventional local treatments there is an oral treatment which is particularly well suited to people living in institutional accommodation. If a complication occurs, complementary treatments must be prescribed. The steps to take to manage the disease must be explained to the patient.

© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved

Afin de traiter la gale, et en l'absence de l'existence d'un consensus, le prescripteur doit choisir la forme du traitement, local ou *per os*, la mieux adaptée en fonction des cas (*tableaux 1 et 2*). La gale est souvent responsable d'épidémie dans les collectivités où le traitement par voie orale est privilégié car il permet de traiter un plus grand nombre de personnes en même temps. Le traitement *per os* est également recommandé pour les gales norvégiennes, associé ou non à un traitement scabicide local et kératolytique.

Traitements locaux conventionnels

Les traitements topiques acaricides de la gale se présentent sous forme de lotion (Sprégal[®], Ascabiol[®]). Ils sont disponibles sans ordonnance, mais ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Ils doivent être appliqués de façon simultanée aux sujets atteints et aux sujets contacts, même en l'absence de signe clinique. Leur délai d'action est immédiat.

Le mode d'administration, très spécifique, doit être précisé lors de la délivrance. Les produits doivent être appliqués après une toilette soigneuse de tout le corps, de préférence le soir afin d'éviter toute toilette ultérieure (même des mains), et en insistant sur l'hygiène des ongles (courts et brossés). Certaines zones doivent être particulièrement traitées : tous les plis, les ongles, l'ombilic, les espaces interdigitaux des mains et des pieds, la face antérieure des poignets et les parties génitales.

Ces traitements topiques étant irritants, il ne faut pas répéter de façon inconsidérée leur application sans avis médical.

Benzoate de benzyle, sulfiram (Ascabiol[®])

Le benzoate de benzyle et le sulfiram sont actifs sur tous les stades du cycle de développement du parasite.

Le mode d'action n'est pas encore bien défini sur les acariens, mais il entraînerait la mort du sarcopte en agissant sur son système nerveux. Son action est immédiate. La lotion doit être appliquée après un bain et sur une peau encore humide. L'application nécessite un pinceau plat, type "queue de morue", de 7 à 10 cm de large et à poils synthétiques. Le patient doit appliquer, par badiageonnage, une ou deux couches successives sur la totalité de la surface corporelle, en respectant un temps de séchage entre les deux couches de 10 à 15 minutes. Le pinceau doit ensuite être nettoyé et désinfecté avec un détergent, puis jeté à la fin du traitement. Au bout de 24 heures, le patient doit se savonner, se rincer abondamment, puis se sécher par tamponnement.

Le traitement par Ascabiol[®] de l'enfant de moins de 2 ans suit la même conduite que chez l'adulte. Il nécessite de se limiter à une seule application d'une durée inférieure à 12 heures et de lui bander les mains ou de lui mettre des mouffles pour éviter une ingestion accidentelle.

Quelques effets indésirables peuvent survenir avec Ascabiol[®] et notamment des manifestations locales : une sensation possible de cuisson immédiate et une possible eczématisation, particulièrement accrue en cas d'applications itératives.

Des manifestations générales, telles que des convulsions en cas d'ingestion accidentelle, peuvent également être observées. En cas de passage cutané, le risque systémique augmente si la peau est lésée et chez l'enfant de moins de 2 ans.

Esdépalléthrine, butoxyde de pipéronyle (Sprégal[®] lotion)

L'esdépalléthrine (esbiol) est un pyréthrianoïde de synthèse, associé au butoxyde de pipéronyle pour son action synergique. Elle agit sur les parasites adultes, les

Nathalie BARACHY
Gilles DREYFUSS
Jérémy VONO

Mots clés

- Conseil
- Contre-indication
- Examen parasitologique
- Gale
- Prurit
- Traitement

Keywords

- Advice
- Contraindication
- Parasitological examination
- Pruritus
- Scabies
- Treatment

Auteur correspondant

Gilles DREYFUSS
gilles.dreyfuss@unilim.fr

Tableau 1. Les principaux traitements de la gale.

	Sprégal® aérosol	Ascabiol®	Stromectol®
Voie d'administration	Topique	Topique	<i>Per os</i>
Principes actifs	Esdépalléthrine, butoxyde de pipéronyle	Benzoate de benzyle, sulfiram	Ivermectine
Présentation	Lotion : flacon pressurisé de 152 g	Lotion : flacon de 125 mL	Comprimé dosé à 3 mg Boîte de 4 ou 20 comprimés (modèle hospitalier)
Effets indésirables	Picotements, irritation cutanée	Sensation de cuisson immédiate, eczématisation	Exacerbation transitoire du prurit en début de traitement, hyperéosinophilie transitoire, anomalies de la fonction hépatique, hématurie
Contre-indications	Antécédents d'allergie à l'un des constituants, sujets asthmatiques, nourrissons ou jeunes enfants ayant des antécédents de bronchite dyspnéisante avec sibilants	Antécédents d'allergie à l'un des constituants	Antécédents d'allergie à l'un des constituants
Nombre d'applications	Une pulvérisation (à renouveler 8 jours plus tard si persistance des signes cliniques)	Chez l'adulte : 2 badigeonnages successifs, espacés de 15 minutes (renouveler une application 8 jours plus tard si persistance des signes cliniques)	Une dose de 200 µg d'ivermectine par kilogramme de poids corporel, administrée à jeun avec de l'eau, à distance des repas (2 heures) Les comprimés peuvent être écrasés
Durée de contact	12 heures, puis savonner et rincer abondamment	24 heures, puis savonner et rincer abondamment	
Mode d'administration	Appliquer après un bain, sur peau sèche, sur tout le corps, de haut en bas, sauf le visage et le cuir chevelu, en tenant le flacon éloigné de 20 à 30 cm et en protégeant le visage avec un linge ou un masque En cas de lésions du visage, les frotter avec un coton imbibé de la solution	Appliquer sur une peau encore humide après la douche, à l'aide d'un pinceau plat, en 1 ou 2 couches, sur tout le corps, y compris les organes génitaux, en insistant sur les plis et les mains. Éviter d'appliquer le produit sur le visage, le cuir chevelu et les muqueuses	
Grossesse	À éviter	Une seule application avec une durée inférieure à 12 heures	À éviter
Enfants	Protéger les voies aériennes lors de l'utilisation de l'aérosol	Chez l'enfant de moins de 2 ans : 1 application de moins de 12 heures	Contre-indiqué chez les enfants de moins de 15 kg
Agrément aux collectivités	Non agréé aux collectivités	Agréé aux collectivités	Agréé aux collectivités
Prise en charge	Non remboursé par la Sécurité sociale	Non remboursé par la Sécurité sociale	Remboursé par la Sécurité sociale à 65 %
Liste	Non listé	Non listé	Liste II

larves et les œufs. Elle est présentée sous forme de lotion en aérosol, ce qui facilite son utilisation par simple pulvérisation sur la majorité du corps (à l'exception du cuir chevelu où il faut utiliser un coton imbibé de produit). Il est important de préciser au patient de ne pas fumer et de se tenir éloigné de toute flamme ou objet incandescent durant l'application.

La lotion Sprégal®, présentée en flacon pressurisé, doit être pulvérisée, dans une pièce bien aérée. Les yeux, le nez et la bouche doivent être protégés avec un linge. Le produit doit être administré en tenant le flacon éloigné de 20 à 30 cm, de haut en bas du corps de façon à recouvrir toute la surface corporelle, y compris les organes génitaux, sans laisser d'espace non traité. Les régions correctement

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/2476000>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/2476000>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)