

European College of Orthodontics

Commission of Affiliation and Titularisation

Collège Européen d'Orthodontie Commission d'affiliation et de titularisation

Guillaume LECOCQ

41, rue du Rempart, 59300 Valenciennes, France

Available online: 7 February 2015 / Disponible en ligne : 7 février 2015

Case No: 14111

Summary

Date of birth: 18/08/1992; sex: female.

A. Pretreatment records

(17 y 4 m; 17/12/2009).

Diagnosis

Angle Class II division 2 (deep bite and maxillary lingual incisor tipping) left subdivision with mandibular retrusion in a hypodivergent facial pattern. Teeth missing prior to treatment: none.

Treatment plan

Correction of the Class II, 2 occlusal anomalies. Appliances and devices: bimaxillary lingual multibracket appliances.

Treatment commenced

17 y 6 m; 16/02/2010.

B. Post-treatment records

20 y; 9/2012.

Duration of active treatment

31 months.

End of treatment

10/2012.

C. Postretention records

(1 year minimum): 21 y 6 m; 3/2014.

Duration of retention

18 months.

Case n° : 14111

Résumé

Date de naissance : 18/08/1992 ; sexe : féminin.

A. Documents avant traitement

17 ans et 4 mois ; 12/2009.

Diagnostic

Classe d'angle : classe II division 2 (supraclusion et linguoversion incisive maxillaire) subdivision gauche avec rétromandibulie dans un contexte hypodivergent. Dents absentes avant traitement : aucune.

Plan de traitement

Correction des anomalies de l'occlusion de la classe II.2. Appareils ou moyens : multattaché lingual bimaxillaire.

Début de traitement

17 ans et 6 mois ; 02/2010.

B. Documents de fin de traitement

20 ans ; 9/2012.

Durée de traitement actif

31 mois.

Fin de traitement

10/2012.

C. Documents après contention

(1 an minimum) : 21 ans et 6 mois ; 3/2014.

Durée de contention

18 mois.

*Correspondence and reprints / Correspondance et tirés à part.
e-mail address / Adresse e-mail : guillecocq@gmail.com

Description of the diagnosis and malocclusion

Summary:

— class II division 2 (deep bite and maxillary incisor lingual tipping) subdivision left with mandibular retrusion in a hypodivergent facial pattern.

Extraoral examination:

- facial view: slight left-side chin asymmetry;
- profile: very pronounced labiomental fold, retrusive mandible offset by a protrusive chin and open nasolabial angle;
- smile: unattractive, gingival, revealing the retroversion of the maxillary incisors.

Functional examination:

- ventilation: nasal;
- swallowing/speech: normal;
- mastication: nothing to report;
- parafunctions: nothing to report.

Intraoral examination:

- right molar and canine class I;
- left-side 7 mm molar and canine class II;
- 7 mm deep bite;
- retroversion of the maxillary incisors, extraocclusal 14;
- healthy periodontium but presence of retroincisal calculus and palatal bite at 11 and 21.

Dental casts:

- arch form: oval maxilla, parabolic mandible;
- crowding: -3.5 mm;
- curve of Spee: very pronounced;
- irregular tooth positions: palatal tipping of 11 and 21, labial tipping of 12-22 and 14, lingually-positioned 33, mesio-lingual rotation of 31 and 41.

Description du diagnostic et de la malocclusion

Résumé :

— classe II division 2 (supraclusion et linguoversion incisive maxillaire) subdivision gauche avec rétromandibulie dans un contexte hypodivergent.

Examen exobuccal :

- face : discrète asymétrie du menton vers la gauche ;
- Profil : sillon labio-mentonnier très marqué, mandibule retrusive compensée par une progénie et angle naso-labial ouvert ;
- sourire : inesthétique, gingival, montrant la rétroversion des incisives maxillaires.

Examen fonctionnel :

- ventilation : nasale ;
- déglutition/phonation : normale ;
- mastication : RAS ;
- parafonctions : RAS.

Examen endobuccal :

- classe I molaire et canine à droite ;
- classe II molaire et canine à gauche de 7 mm ;
- supraclusion de 7 mm ;
- rétroversion des incisives maxillaires, exocclusion de 14 ;
- parodontie sain, mais présence de tartre rétro-incisif et morsure palatine en regard de 11 et 21.

Moulages dentaires :

- forme des arcades : maxillaire ovoïde, mandibule parabolique ;
- encombrement : -3,5 mm ;
- courbe de Spee : très marquée ;
- malpositions: palatoversion de 11 et 21, vestibuloversion de 12-22 et 14, linguoposition de 33, rotations mésio-linguales de 31 et 41.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3135598>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3135598>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)