

Możliwości i ograniczenia techniki wewnątrznosowej operacji brodawczaka odwróconego nosa i zatok przynosowych – doświadczenia własne.

Doniesienie wstępne

Possibility and limits of the endonasal approach in sinonasal inverted papilloma cases – the technique and own experience. Preliminary report

Grzegorz Matyja

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej PAM
Kierownik: prof. dr hab. n. med. C. Tarnowska

Summary

The aim of this article is to present the technique of endonasal operation due to sinonasal inverted papilloma with its limitations. Material consists of 21 patients operated with microscope and endoscopes. The tumor is resected in few pieces, but I try (especially in the beginning) to keep the resected tumor as much as possible in one part – which makes easier to assess the tumor borders. Mostly it is possible to leave at place the inferior turbinate and only the upper part of it must be resected with the tumor. Involvement of the frontal sinus is the contraindications for a purely endonasal approach, but this involvement must be assessed intraoperatively, due to preoperative CT scan limitations. Tumor involving the orbit is also contraindication to endonasal approach. Tumor is resected with anterior or total ethmoidectomy, because of coexistence of inflammations in sinuses. It is possible to resect tumor from all ethmoid cells and both sphenoid sinuses from endonasal approach. Mostly it is possible to resect tumor from maxillary sinus from endonasal approach. I leave a healthy mucosa of the maxillary sinus and resect only tumor and the margins. But in the case of prelacrima recess involvement of the maxillary sinus or difficulty with removing tumor from the bottom of the sinus I open it through the Caldwell-Luck approach (2 cases). Postoperative cavity usually heals very well. In the presented material I didn't observed recurrence of the tumor and the patients are very well (17 patients: 1–4.5 years of observation, 4 patients: under 1 year of observation). Advantages of the endonasal method are: small bleeding, operation under magnification, good view around the corner in 70° endoscope, leaving anterior bony wall of the maxillary sinus, leaving inferior turbinate and small post-op. disturbances, relatively small op. injury and quick healing, possibility of removing the tumor from the nose, ethmoidal and sphenoidal and maxillary sinuses (mostly), possibility to extend the operation with external approaches if needed. Disadvantages and limits of the method are: not possible to remove the tumor from frontal sinus, difficulty in removing the tumor from prelacrima sac recess (sometimes combined approach needed).

Hasła indeksowe: brodawczak odwrócony, endoskop, mikroskop, technika operacyjna

Key words: inverted papilloma, endoscope, microscope, operating technique

Otolaryngol Pol 2007; LXI (6): 926–930 © 2007 by Polskie Towarzystwo Otorinolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi

WSTĘP

Brodawczak odwrócony (*inverted papilloma* – IP) jest najczęściej występującym nowotworem łagodnym nosa i zatok przynosowych. Budowa histologiczna,

biologia guza oraz niebezpieczeństwo jego zezłośliwienia było opisane w licznych publikacjach [1–15], w tym w piśmiennictwie polskim [3, 4, 6–8, 10, 13, 15].

W tutym ośrodku, na podstawie danych z literatury oraz obserwacji własnych, uznaje się,

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

że operacją z wyboru u chorych z IP jest operacja wewnątrznosowa.

Celem publikacji jest przedstawienie techniki operacji wewnątrznosowej chorych z brodawczakiem odwróconym nosa i zatok przynosowych oraz ocena możliwości i ograniczeń tej metody.

MATERIAŁ I METODY

Materiał stanowi 21 chorych (11 mężczyzn i 10 kobiet) w wieku 41–82 lat (średnia 62 lata) leczonych operacyjnie w latach 2002–2007. Guz stwierdzono u 6 po stronie prawej i 15 po lewej. Przed operacją IP rozpoznano u 7 pacjentów (w tym 5 operowanych z powodu wznowy) u 10 polipy nosa, u 2 zmianę zapalną, natomiast u 2 było podejrzenie nowotworu złośliwego (kwalifikowani do pobrania materiału). Rozległość guza oceniono na podstawie badania TK oraz oceny śródoperacyjnej. Ostateczne rozpoznanie IP postawiono na podstawie pooperacyjnego badania histopatologicznego. Okres obserwacji wynosi u 17 pacjentów 1–4,5 lat a u pozostałych 4 poniżej 1 roku.

Chorych zakwalifikowano do operacji wewnątrznosowej (tab. I).

TECHNIKA OPERACYJNA

U wszystkich chorych operacje wykonywano w znieczuleniu ogólnym z ciśnieniem skurczowym krwi w granicach 100 mm Hg, choć w pojedynczych przypadkach występowały skoki ciśnienia znacznie utrudniające operowanie. Dodatkowo znieczulano pole operacyjne Lignokainą z dodatkiem Adrenaliny. Wykorzystywano mikroskop operacyjny oraz endoskopy operacyjne 30° i 70°.

Istotnym elementem operacji była ocena rodzaju i rozległości zmian. TK jest bardzo cennym źródłem oceny przedoperacyjnej. Trudno jest jednak w tym badaniu odróżnić zmiany zapalne od brodawczaka. Natomiast ocena endoskopowa przed operacją posiada ograniczenia wynikające z badania w znieczuleniu miejscowym. Dlatego badanie śródoperacyjne przed wykonaniem cięć wewnątrznosowych, w suchym polu, ma kluczowe znaczenie. Po odsunięciu ewentualnych zmian polipowatych i medial-

Tabela I. Rozległość guza u poszczególnych pacjentów

L.p.	Przewód środkowy nosa	Zatoka szczękowa	Sitowie przednie	Zachyłek czołowy	Sitowie tyłne	Przegroda nosa	Przewód górny nosa	Przednia powierzchnia zatoki klinowej	Obie zatoki klinowe
1	+	+	+		+			+	+
2	+	+	+						
3	+	+	+						
4						+	+	+	
5	+	+	+						
6	+	+	+						
7	+	+	+	+					
8	+	+	+		+				
9	+	+							
10	+	+	+		+				
11	+	+	+						
12	+		+		+				
13	+		+						
14	+	+							
15	+	+							
16	+		+						
17	+	+							
18	+	+	+						
19	+		+		+				
20	+	+	+						
21	+								

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3171292>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3171292>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)