



Disponible en ligne sur
 ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
 EM|consulte
www.em-consulte.com



REVUE GÉNÉRALE

Pyoderma gangrenosum : cicatrisation spontanée à la suite d'un diagnostic précoce. À propos de trois cas et revue générale

Pyoderma gangrenosum: Spontaneous healing after early diagnosis. About three cases and general review

R. Viard ^{a,*}, A. Scevola ^{a,b,c}, M. Veber ^a, G. Toussoun ^a, E. Delay ^{a,d}

^a Unité de chirurgie plastique et reconstructrice, centre Léon-Bérard, 28, rue Laënnec, 69373 Lyon cedex 08, France

^b Unità di Chirurgia Plastica Generale, Ospedale CTO, via Zuretti, 29, Torino, Italie

^c Università degli Studi di Genova, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva Largo R. Benzi, 10, 16132 Italie

^d Cabinet, 50, rue de la République, 69002 Lyon, France

Reçu le 19 juillet 2010 ; accepté le 3 janvier 2011

MOTS CLÉS

Pyoderma gangrenosum ;
Sein ;
Retard cicatrisation ;
Infection
postopératoire ;
Nécrose cutanée

Résumé

Introduction. — Le pyoderma gangrenosum (PG) est une affection dysimmunitaire rare caractérisée par une lésion nécrotique rapidement extensive posant un problème diagnostique. Cette affection peut mimer une infection fulminante notamment après un geste chirurgical. Les tableaux décrits sont souvent impressionnants et conduisent à des séquelles importantes.

Patients et méthodes. — Nous rapportons le cas de trois patientes présentant cette pathologie dans un contexte de reconstruction mammaire après cancer du sein.

Discussion. — Le PG est une dermatose neutrophilique pouvant survenir après des traumatismes d'intensité variable. Sa forme postchirurgicale est une maladie rare dont la présentation bruyante et rapide d'allure « infectieuse » contraste avec l'absence de lymphangite ou d'adénopathies inflammatoires. Il faut savoir prescrire de la corticothérapie à haute dose.

Conclusion. — Ces trois observations illustrent l'intérêt d'un diagnostic et d'un traitement précoces du PG, permettant ainsi la guérison spontanée par cicatrisation dirigée sans geste chirurgical complexe, toujours redouté dans ce contexte.

© 2011 Publié par Elsevier Masson SAS.

* Auteur correspondant. 3, rue Saint-Paul, 69005 Lyon cedex 05, France.
Adresse e-mail : romainviard@yahoo.fr (R. Viard).

KEYWORDS

Pyoderma gangrenosum;
Breast;
Delayed healing;
Post-surgery infection;
Skin necrosis

Summary

Introduction. — Pyoderma gangrenosum (PG) is a rare chronic inflammatory skin disease characterized by the recurring development of necrotizing and painful ulcers and therefore, often misinterpreted. This condition can simulate fulminant infection, particularly after surgery. The presentation is often impressive in extensive ulcerations and scarring and lead to significant sequelae. A rapid initial management avoids a dramatic evolution.

Patients and methods. — We report the case of three PG for patients followed for breast reconstruction after breast cancer.

Discussion. — PG is a neutrophilic dermatosis that can occur after injuries of varying intensity. Its shape after surgery is a rare disease whose presentation loud and fast pace "infectious" contrasts with the absence of inflammatory lymphangitis or lymphadenopathy. Be aware of prescribing high doses of corticosteroids.

Conclusion. — These three cases illustrate the importance for early diagnosis and treatment of PG, who can allow spontaneous healing without complex surgery, always feared in this context.

© 2011 Published by Elsevier Masson SAS.

Introduction

Le pyoderma gangrenosum (PG) est une affection dysimmunitaire rare de type dermatose neutrophilique [1] souvent associée à certaines pathologies systémiques. Elle se caractérise par une lésion nécrotique ulcéreuse rapidement extensive, pouvant mimer une infection fulminante, notamment après un geste chirurgical [2].

Le traitement antibiotique est inefficace, or, le débridement chirurgical est un facteur d'aggravation locale conduisant à l'extension des lésions : pour cette raison, un diagnostic précoce est important.

Les tableaux décrits sont souvent impressionnants et conduisent à des séquelles majeures.

Nous rapportons les cas de trois patientes présentant cette pathologie dont le diagnostic précoce a permis la stabilisation,




Figure 1 A. Radiodermite invalidante : traitement par mastectomie radicale plus couverture par lambeau myo-cutané graisseux de *latissimus dorsi*. B. Pyoderma gangrenosum à j10. Diagnostic fait à 48 heures d'évolution. C—D. Cicatrisation spontanée en trois mois.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3184794>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3184794>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)