



PIEL

FORMACION CONTINUADA EN DERMATOLOGIA

www.elsevier.es/piel



Original

Análisis descriptivo de los motivos de consulta dermatológica en pacientes mayores de 65 años en el hospital clínico San Cecilio de Granada

Husein Husein-ElAhmed*, Salvador Arias-Santiago, Pilar Burkhardt Pérez y Ramón Naranjo Sintés

Servicio de Dermatología, Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

On-line el 6 de enero de 2010

Palabras clave:

Consulta

Dermatológica

Pacientes

Análisis

Descriptivo

RESUMEN

Introducción: El objetivo del presente estudio es valorar los motivos de derivación dermatológica de pacientes de edad igual o superior a 65 años a la consulta ambulatoria de un hospital de tercer nivel.

Material y método: Estudio descriptivo transversal en el que se analizan las 7 consultas del hospital Clínico San Cecilio, estudiándose los motivos de consulta durante un periodo de dos meses (febrero-marzo de 2009). Se realizó un análisis de la distribución por sexos, edad, diagnóstico y tratamiento prescrito y/o aplicado.

Resultados: De 1.594 pacientes, 218 (13,7%) eran mayores de 65 años (46% varones y 54% mujeres) con una edad media de 73,4 años. El diagnóstico más frecuente fue carcinoma basocelular (18,3%, 40 pacientes) seguido de queratosis actínica (15,3%, 33 pacientes) y queratosis seborreica (9,9%, 22 pacientes). Le siguieron en frecuencia las dermatosis inflamatorias. El tratamiento prescrito fue médico en 96 pacientes (44,2%) y 43 pacientes (19,84%) se programaron para cirugía. No acudieron 11 pacientes (5,34%).

Discusión: El 45% de los pacientes se agrupan en 3 diagnósticos: carcinoma basocelular, queratosis actínica y queratosis seborreica. La patología tumoral, carcinoma basocelular y queratosis actínica, fueron las más numerosas (33,3%). Su asociación a fotoexposición crónica y acumulativa a lo largo de la vida, hace necesaria la insistencia en la fotoprotección como medida de prevención primaria. El resto de pacientes, 55% se distribuían en múltiples diagnósticos que sumaban pocos casos individualmente.

Conclusión: La población española de edad igual o mayor de 65 años está en aumento y, paralelamente, las consultas dermatológicas de este grupo de edad, por lo que es necesario tener presente qué patologías son las más frecuentes y cómo prevenirlas y tratarlas.

© 2009 Elsevier España, S.L Todos los derechos reservados.

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: huseinelahmed@hotmail.com (H. Husein-ElAhmed).

Descriptive analysis of reasons for dermatological consultations in patients aged more than 65 years old in the hospital clínico San Cecilio in Granada (Spain)

A B S T R A C T

Keywords:
Consultation
Dermatological
Patients
Analysis
Descriptive

Introduction: The aim of this study was to assess the reasons for referring patients aged 65 years or more to the dermatology outpatient department of our third level hospital.

Material and Methods: We performed a descriptive cross-sectional study of the reasons for referrals over a 2-month period (February-March 2009). An analysis of distribution by age, sex, diagnosis and the treatment prescribed and/or applied was performed.

Results: Of 1,594 patients, 218 (13.7%) were older than 65 years (46% males and 54% women) with a mean age of 73.4 years. The most frequent diagnosis was basal cell carcinoma (18.3%, 40 patients), followed by actinic (15.3%, 33 patients) seborrheic keratosis (9.9%, 22 patients), and inflammatory dermatoses. Medical treatment was prescribed in 96 patients (44.2%) and 43 (19.84%) were scheduled for surgery. Eleven patients failed to attend (5.34%).

Discussion: A total of 45% of the patients were grouped into three diagnoses: basal cell carcinoma, actinic keratosis and seborrheic keratosis. Oncological diseases, basal cell carcinoma and actinic keratosis were the most frequent diagnoses (33.3%). The association of these entities with chronic and cumulative photoexposure over the lifespan highlights the need to stress photoprotection as a primary prevention measure. The remaining 55% of the patients were distributed in multiple diagnoses that individually accounted for few cases.

Conclusion: Both the Spanish population aged over 65 and dermatological consultations in this age group are increasing. Consequently, the most common diseases and their prevention and treatment in this population should be kept in mind.

© 2009 Elsevier España, S.L All rights reserved.

Introducción

Durante los últimos años, la demanda de las consultas de dermatología ha experimentado un importante incremento¹⁻³, sobre todo en la población de edad más avanzada, asociado al aumento en la esperanza de vida; así, según un informe de las Naciones Unidas, en 2050, España será el país más envejecido del mundo con 35,6% de la población mayor de los 65 años⁴. Aunque la mayoría de las enfermedades dermatológicas abarcan un amplio rango de edad, pensamos que existen algunos procesos más frecuentes en este grupo que requieren un manejo especial, teniendo en cuenta las comorbilidades que asocian, a diferencia de pacientes dermatológicos de otras edades. El ejemplo principal es la patología tumoral cutánea, sobre todo el cáncer cutáneo no melanoma, como el carcinoma basocelular y espinocelular, que alcanzan las mayores tasas de incidencia en este grupo. Desde hace unos años, es de gran utilidad un tratamiento alternativo a la cirugía, con imiquimod⁵ en crema en aquellos pacientes ancianos en los que el tratamiento quirúrgico pueda estar contraindicado o que rechacen la cirugía.

El objetivo de este estudio es analizar el motivo de consulta por el que son derivados los pacientes de edad igual o superior de 65 años en el Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, así como las características diagnósticas y terapias utilizadas.

Material y método

Se trata de un estudio descriptivo de tipo transversal en el que se han analizado los pacientes de edad igual o mayor a 65 años que acudieron a nuestra consulta durante el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2009 y el 12 de marzo de 2009. Se realizó un análisis descriptivo de la distribución por sexo, edad, diagnóstico, tratamiento prescrito y/o aplicado, así como tiempo de evolución. Los criterios de inclusión son la edad mayor a 65 años y que se trate de la primera visita al dermatólogo. Se excluyeron aquellos pacientes que acudían para revisión de patologías previamente diagnosticadas y tratadas.

Resultados

En total se visitaron 1.594 pacientes, de ellos 218 (13,7%) eran mayores de 65 años (46% varones y 54% mujeres) con una edad media de 73,4 años. El tiempo de evolución de las lesiones hasta la consulta fue de 18,3 meses. El diagnóstico más frecuente fue carcinoma basocelular (40 pacientes, 18,3%) seguido de queratosis actínica (33 pacientes, 15,1%) y queratosis seborreica (22 pacientes, 10,1%). La *tabla 1* recoge la totalidad de diagnósticos.

El tratamiento que recibieron los pacientes fue en su mayoría médico (44,2%, 96 pacientes) y 43 pacientes (19,84%)

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3221665>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3221665>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)