



Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com



USAGE HORS AMM : TOCOLYSE

L'usage hors AMM des inhibiteurs calciques en tocolyse – méthodes et organisation

Off-label use of calcium channel blockers for tocolysis – Methods and organization

E.G. Simon ^{a,*}, F. Perrotin ^{a,b}

^a Pôle de gynécologie-obstétrique, médecine fœtale, médecine et biologie de la reproduction, génétique, centre Olympe-de-Gouges, CHRU de Tours, 2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours cedex, France

^b UMR Inserm U 930, université François-Rabelais de Tours, 2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours cedex, France

Reçu le 14 novembre 2014 ; définitivement accepté le 2 décembre 2014

MOTS CLÉS

Prescription hors AMM ;
Tocolyse ;
Inhibiteurs des canaux calciques ;
Méthodologie

KEYWORDS

Off-label prescribing;
Tocolysis;
Calcium channel blockers;
Methodology

Objectifs du groupe de réflexion

Le travail proposé ici porte sur l'usage hors autorisation de mise sur le marché (AMM) des inhibiteurs des canaux calciques (ICC) et s'inscrit dans une réflexion plus large sur les prescriptions hors AMM en gynécologie-obstétrique. En 2013, le Collège national des gynécologues-obstétriciens français (CNGOF) a publié un avis d'experts portant sur l'usage hors AMM du misoprostol dans notre spécialité [1]. À la différence de ce précédent travail sur le misoprostol, les textes proposés ici concernent une classe thérapeutique entière et non pas une molécule unique. Toutefois, l'usage hors AMM des ICC en obstétrique ne concerne que deux molécules : la nifédipine et la nicardipine, et ne concerne que deux situations : la tocolyse aiguë et la tocolyse d'entretien. L'utilisation des ICC dans le cadre des pathologies hypertensives de la grossesse est conforme à l'AMM de ces produits et sort donc du champ de notre travail. Dans le **Tableau 1**, nous rappelons les intitulés exacts des AMM de la nifédipine, de la nicardipine et de leurs compétiteurs pour la prévention de l'accouchement prématuré. En 2002, les recommandations pour la pratique clinique

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : emmanuel.simon@univ-tours.fr (E.G. Simon).

Tableau 1 Synthèse des principales spécialités pharmaceutiques étudiées (AMM, voie d'administration, contre-indications, coûts et modalités de conservation).
Overview of major pharmaceutical specialties studied.

Spécialité pharmaceutique / laboratoire	DCI / forme et composition	Voie d'administration	AMM	Contre-indications	Présentation et coût
Adalate® 10 mg / Bayer Santé	Nifédipine / capsule à 10 mg	Orale	Angor de Prinzmetal Angor stable en association aux bêtabloquants, lorsque les autres thérapeutiques anti-angineuses sont contre-indiquées ou insuffisamment efficaces Traitement symptomatique des phénomènes de Raynaud	Hypersensibilité à la nifédipine Infarctus du myocarde datant de moins de un mois Angor instable Choc cardio-vasculaire En association avec le diltiazem Ce médicament est généralement déconseillé pendant la grossesse ou l'allaitement	Boîtes de 30 et de 90, sous plaquettes thermoformées 30 capsules : 2,93 € 90 capsules : 6,41 €
Adalate® 20 mg LP / Bayer Santé	Nifédipine / comprimé à 20 mg, libération prolongée	Orale	Hypertension artérielle	Hypersensibilité à la nifédipine Infarctus du myocarde datant de moins de un mois Angor instable Choc cardio-vasculaire En association avec le diltiazem Ce médicament est généralement déconseillé pendant la grossesse ou l'allaitement	30, 60, 100 ou 180 comprimés sous plaquettes thermoformées, respectivement, 4,75, 8,77 et 24,64 €
Chronadate® LP 30 mg / Bayer Santé	Nifédipine / comprimé à 30 mg, libération prolongée	Orale	Hypertension artérielle Traitement préventif de l'angor instable, en association avec un traitement bêtabloquant	Hypersensibilité à la nifédipine Infarctus du myocarde datant de moins de un mois Angor instable Choc cardio-vasculaire En association avec le diltiazem Chez les patients ayant subi une iléostomie après procto-colectomie Ce médicament est généralement déconseillé pendant la grossesse ou l'allaitement	28, 30, 50, 90 ou 100 comprimés sous plaquettes thermoformées 30 comprimés : 11,1 € 90 comprimés : 31,25 €
Loxen® 20 mg / Novartis Pharma SAS	Nicardipine (chlorhydrate de) / comprimé sécable à 20 mg	Orale	Hypertension artérielle	Hypersensibilité à la nicardipine Infarctus du myocarde datant de moins de un mois Angor instable	30, 60, 90 ou 270 comprimés sous plaquettes thermoformées 30 comprimés : 5,82 € 90 comprimés : 15,45 €

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3272224>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3272224>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)