



Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com



ARTICLE ORIGINAL

Pornographie, comportements sexuels et conduites à risque en milieu universitaire[☆]



Pornography sexual behavior and risk behavior at university

C. Bulot^{a,*}, B. Leurent^b, F. Collier^c

^a Service d'orthogénie, centre hospitalier de Tourcoing, CH Dron, 155, rue du Président-Coty, BP619, 59208 Tourcoing cedex, France

^b London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, WC1 7HT London, Royaume-Uni

^c Service d'orthogénie et médecine du couple, hôpital Jeanne-de-Flandre, CHRU de Lille, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille cedex, France

Disponible sur Internet le 29 octobre 2015

MOTS CLÉS

Pornographie ;
Étudiants ;
Comportement
sexuel ;
Conduites à risque ;
Infection
sexuellement
transmissible (IST)

Résumé

Introduction. — L'industrie pornographique est omniprésente chez les adolescents qui sont pratiquement tous exposés via Internet, volontairement ou non, et à un âge plus ou moins précoce. Existe-t-il un lien entre l'exposition à la pornographie et certaines conduites à risque ?

Méthode. — Huit cent douze étudiants lillois ont répondu anonymement à un questionnaire proposé à l'occasion d'une consultation en centre de santé. L'analyse statistique a été menée à l'aide de régressions logistiques et linéaires.

Résultats. — L'exposition à la pornographie concerne pratiquement tous les hommes et 80 % des femmes. L'âge moyen de la première exposition est de 15,2 ans. La précocité d'exposition est liée à une activité sexuelle plus précoce, à une recherche de partenaires occasionnel(le)s plus fréquente et à une consommation de cannabis plus fréquente. L'âge d'exposition ne semble pas en revanche influencer le nombre de partenaires sexuel(le)s, le fait de pratiquer la pénétration anale, la consommation d'alcool ou de tabac, l'utilisation de contraceptifs et la prise de risque vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles. Le fait de regarder fréquemment des images pornographiques est lié à une activité sexuelle plus précoce, à un plus grand nombre de partenaires sexuel(le)s, au fait de rechercher des partenaires occasionnel(le)s, à une pratique de la pénétration anale, à une moindre prévention des infections sexuellement transmissibles

DOI de l'article original : <http://dx.doi.org/10.1016/j.sexol.2015.09.006>.

[☆] An English version of this article is available online, at <http://dx.doi.org/10.1016/j.sexol.2015.09.006>.

* Auteur correspondant.

Adresses e-mail : bulotchristine2@gmail.com (C. Bulot), baptiste.leurent@shstm.ac.uk (B. Leurent), francis.collier@chru-lille.fr (F. Collier).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.sexol.2015.09.007>

1158-1360/© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS

Pornography;
Students;
Sexual behaviour;
Risk behaviour;
Sexually transmitted
infection (STI)

et des grossesses non désirées et enfin à une augmentation des consommations d'alcool et de cannabis. En conclusion, ces résultats doivent interpeller et amener tous les acteurs de santé sexuelle et d'éducation à la sexualité à renforcer l'information donnée aux adolescents.

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Introduction. – The pornography industry is a pervasive influence on adolescents, nearly all of whom are exposed to it via the internet, either willingly or unwillingly and at a more or less premature age. Is there an association between exposure to pornography and some forms of risk behaviour?

Method. – Eight hundred and twelve Lille students responded anonymously to a questionnaire given to them on the occasion of a consultation at a health centre. Logistic and linear regressions were used for statistical analysis.

Findings. – Nearly all men and 80% of women had been exposed to pornography. The average age of initial exposure was 15.2 years. Exposure at a premature age is associated with sexual activity at a younger age and with a greater inclination to seek out casual partners and use cannabis more frequently. The age of exposure does not on the other hand appear to have any influence on the number of sexual partners, the practice of anal penetration, alcohol or tobacco consumption, contraceptive use and taking risks in terms of sexually transmitted infections. Frequent viewing of pornographic images is associated with sexual activity at a younger age, a larger number of sexual partners, an inclination to seek out casual partners, the practice of anal penetration, a lower level of prevention of sexually transmitted infections and unwanted pregnancies and finally, a higher consumption of alcohol and cannabis. In conclusion, these findings should be taken into account, and should lead those involved in sexual health and sex education to increase the amount of information they provide to adolescents.

© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Plusieurs indices permettent aujourd'hui de penser que de profondes modifications des habitudes sexuelles des adolescents et des jeunes adultes sont survenues depuis la fin du XX^e siècle. Les raisons en sont certainement multiples, mais l'une d'entre elles est incontestablement l'influence grandissante des médias et la consommation croissante d'images à caractère sexuel. Ce phénomène a pris une ampleur considérable avec le développement d'Internet et l'omniprésence en son sein de l'industrie pornographique.

Le matériel pornographique proposé sur la toile est extrêmement varié, l'accès en est gratuit et très facile, même pour les mineurs, mais les internautes y sont aussi de plus régulièrement exposés de manière involontaire (Ybarra et al., 2009).

Il est fréquent d'entendre que cette consommation pornographique entraîne d'importants effets néfastes sur le développement sexuel et affectif des jeunes, mais peu de travaux ont tenté d'établir preuve scientifique de cette relation. Sont présentés ici les résultats d'une étude réalisée auprès de plus de 800 étudiants âgés de 17 à 29 ans, dans le but d'examiner le lien potentiel entre l'exposition aux images à caractère pornographique (ICP) d'une part, les habitudes sexuelles et certaines conduites à risque d'autre part.

Population étudiée et méthode

Un questionnaire a été proposé à tous les étudiants consultants dans le centre polyvalent de santé universitaire de

l'université catholique de Lille, ouvert à tous les étudiants du secteur.

Ce questionnaire a été rempli individuellement et de manière anonyme par les étudiants qui le souhaitaient, soit directement en salle d'attente, soit de manière différée, puis déposé dans une urne dédiée à cet effet.

Cette étude prospective a été réalisée à partir des données des questionnaires retournés entre le 4 mars et le 28 juin 2013.

Le questionnaire comportait 25 questions (Annexe 1) concernant les items suivants :

- âge et sexe ;
- âge du premier contact avec des ICP, moyens, fréquence et conditions de la consommation actuelle d'ICP ;
- vécu des ICP ;
- sources d'information sur la sexualité ;
- âge et vécu du premier rapport sexuel ;
- pratiques sexuelles actuelles ;
- consommations d'alcool, de tabac, de drogues ;
- moyen de contraception utilisé ;
- utilisation du préservatif, recours au dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) ;

Les données ont été saisies dans le logiciel ACCESS. L'analyse statistique a été menée au moyen du logiciel SPSS. Quatre variables d'exposition ont été particulièrement analysées : précocité d'exposition aux ICP, fréquence d'exposition supérieure à une fois par semaine, puis

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/342500>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/342500>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)