



Revista Clínica Española

www.elsevier.es/rce



ORIGINAL

Demanda de atención sanitaria en las unidades de identidad de género de Andalucía y Cataluña durante la década 2000 a 2009

E. Gómez-Gil^{a,*}, I. Esteva de Antonio^b, M.C. Almaraz^b, T. Godás Sieso^c,
I. Halperin Rabinovich^d, F. Soriguer Escofet^b y Equipos de Identidad de Género de
Andalucía y Cataluña

^a Servicio de Psiquiatría, Instituto de Neurociencias, Unidad de Identidad de Género de Cataluña, Hospital Clínic, Barcelona, España

^b Servicio de Endocrinología y Nutrición, Unidad de Trastornos de Identidad de Género de Andalucía, Hospital Universitario Carlos Haya, Málaga, España

^c Servicio de Psicología, Instituto de Neurociencias, Unidad de Identidad de Género de Cataluña, Hospital Clínic, Barcelona, España

^d Servicio de Endocrinología, Instituto de Medicina Interna, Unidad de Identidad de Género de Cataluña, Hospital Clínic, Barcelona, España

Recibido el 13 de abril de 2010; aceptado el 6 de febrero de 2011

Disponible en Internet el 6 de abril de 2011

PALABRAS CLAVE

Transexualismo;
Trastorno de la
identidad de género;
Servicios de salud;
Demanda;
Demografía;
Reasignación sexual

Resumen

Objetivo: Evaluar de forma comparada la demanda de atención sanitaria pública en dos unidades de trastornos de la identidad de género (Andalucía y Cataluña) durante la década 2000-2009.

Método: Estudio descriptivo y comparativo de la demanda sanitaria, características de los solicitantes y cirugías realizadas.

Resultados: Han solicitado asistencia sanitaria 828 pacientes en Andalucía y 549 en Cataluña. En ambas comunidades es similar el porcentaje de casos que cumplen criterios de transexualismo (88 vs. 89,8%), la frecuencia de casos excluidos del programa de reasignación sexual (16,7 vs. 15,3%), la razón de sexos hombre/mujer (1,6:1 vs. 2,1:1), y la edad media (28 vs. 29 años). Se han realizado 284 cirugías de reasignación sexual en Andalucía y 50 en Cataluña.

Conclusiones: La demanda en Andalucía se ha mantenido estable y en Cataluña se ha incrementado en los últimos años. Las características demográficas y clínicas de los pacientes transexuales son similares y acordes con la mayoría de estudios realizados en otros países.

© 2010 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: esgomez@clinic.ub.es (E. Gómez-Gil).

KEYWORDS

Transsexualism;
Gender identity disorder;
Health services;
Demand;
Demography;
Sex reassignment

The demand for health care services in the gender identity units of Andalusia and Catalonia during the period of 2000 to 2009

Abstract

Objective: To evaluate the demand for public health services in two gender identity disorder units (Andalusia and Catalonia) during the period of 2000-2009.

Method: A descriptive and comparative study was made of the demand for health services, the demographic and clinical characteristics of the patients, and the sex reassignment surgeries performed.

Results: A total of 828 subjects in Andalusia and 549 in Catalonia requested clinical assistance. In both communities, the percentages of cases diagnosed of transsexualism (88 vs 89.7%), the percentages excluded in the sex reassignment program (16.7 vs 15.3%), the male/female ratio (1.6:1 vs 2.1:1), and the mean age (28 vs 29 years) were similar. A total of 284 sex-reassignment surgeries were performed in Andalusia and 50 in Catalonia.

Conclusions: The demand has been maintained in Andalusia and has increased in Catalonia in recent years. The basic demographic and clinical characteristics of transsexual patients were similar between both units and comparable to those of other countries.

© 2010 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción

Los trastornos de la identidad de género (TIG) se caracterizan por la presencia de un intenso malestar o disforia con el sexo asignado. Los manuales de clasificación DSM-IV-TR y CIE-10 incluyen 4 diagnósticos: el TIG en adolescentes o adultos, también denominado transexualismo, el TIG en la infancia, el travestismo no fetichista y el TIG no especificado. El transexualismo es la entidad más frecuente y se caracteriza por una identificación acusada y persistente con el otro sexo y por un malestar y sentimiento continuo de inadecuación con el propio sexo, que provoca un profundo sufrimiento psicológico y alteraciones importantes en diversas áreas (social, laboral, de pareja) de su vida¹.

La atención sanitaria pública en España a personas con TIG es reciente. La comunidad autónoma de Andalucía fue la primera que aprobó su financiación sanitaria integral en el año 1999 y creó la primera Unidad de Trastornos de Identidad de Género (UTIG) en el Hospital Carlos Haya de Málaga²⁻⁴. En marzo de 2006 se aprueba la segunda unidad en Cataluña con sede en el Hospital Clínic de Barcelona (donde ya se atendía a estos pacientes desde el año 1986), y desde enero de 2009 se incluye también la cirugía de reasignación sexual. En mayo de 2006 se aprueba la tercera unidad integral en la comunidad de Madrid, la cual también acumulaba experiencia previa. Otras autonomías (Aragón, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco) han reconocido el derecho de estas personas al tratamiento en el ámbito de la sanidad pública y han iniciado la atención en salud mental y endocrinología en hospitales públicos¹.

A pesar de la incorporación reciente de la atención sanitaria a estos pacientes en España, ya han sido publicados diversos artículos originales sobre prevalencia e incidencia^{5,6}, características sociodemográficas, clínicas y psicopatológicas de estos pacientes^{7,8}, efectos metabólicos⁹, cognitivos¹⁰ y complicaciones¹¹ asociadas al tratamiento hormonal, técnicas quirúrgicas^{12,13}, satisfacción tras cirugía¹⁴, aspectos conceptuales¹⁵ y posibles bases biológicas de la transexualidad basadas en estudios

sobre estructura y funcionalismo cerebral^{16,17}, agregación familiar¹⁸, orden de nacimiento¹⁹ y estudios genéticos²⁰. También han sido publicados dos libros monográficos nacionales^{1,21} y diversos capítulos de libros²²⁻²⁴. No obstante, aún sigue siendo escasa la información sobre la demanda y necesidades sanitarias de esta población.

El objetivo de este trabajo es evaluar y comparar la evolución de la demanda de atención sanitaria durante 10 años en las unidades de identidad de género de Andalucía y Cataluña, las características demográficas y clínicas de los solicitantes, los procedimientos quirúrgicos realizados y la situación de la lista de espera.

Sujetos y método

La muestra está formada por todos los pacientes que en la década de 2000 a 2009 han solicitado atención sanitaria en las UTIG de Andalucía (Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga) y Cataluña (Hospital Clínic de Barcelona) por manifestar disforia o malestar con el sexo asignado (disforia de género). Se han analizado las siguientes variables obtenidas de la historia clínica: 1) demanda de nuevas visitas a lo largo de 10 años; 2) demanda de otras comunidades; 3) lugar de nacimiento; 4) diagnósticos realizados (criterios diagnósticos DSM-IV-TR y CIE-10)¹; 5) pacientes excluidos del programa de reasignación sexual; 6) razón de sexos y edad a la que acuden a la primera visita en aquellos pacientes que cumplen criterios diagnósticos de transexualismo; 7) número de cirugías de reasignación sexual realizadas, y 8) número de pacientes en lista de espera específica para cada cirugía a fecha de diciembre de 2009. Los criterios para ser excluidos del programa de reasignación sexual han sido no cumplir criterios diagnósticos de transexualismo o no cumplir los criterios recomendados en las guías clínicas internacionales de la Asociación Internacional Harry Benjamin (WPATH)¹. Los datos han sido analizados mediante el programa SPSS, versión 12.0. La comparación de la edad se ha realizado mediante la prueba *t* de Student y la compa-

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3827849>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3827849>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)