Disponible en ligne sur

 www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

 www.em-consulte.com

Article original

Résistance aux quinolones de types *qnr*, *aac* (6′)-*Ib-cr* chez les entérobactéries isolées à Annaba en Algérie

Qnr and aac (6′)-*Ib-cr* types quinolone resistance among *Enterobacteriaceae* isolated in Annaba, Algeria

L. Meradi^a, A. Djahoudi^b, A. Abdi^a, M. Bouchakour^c, J.-D. Perrier Gros Claude^c, M. Timinouni^{c,*}

^aLaboratoire de microbiologie, département de Biochimie, faculté des sciences, université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie

^bLaboratoire de microbiologie, département de pharmacie, faculté de médecine, université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie

^cLaboratoire de bactériologie moléculaire, institut Pasteur du Maroc, 1, place Louis-Pasteur, 20100 Casablanca, Maroc

INFO ARTICLE

Historique de l'article :

Reçu le 25 mars 2009

Accepté le 15 mai 2009

Disponible sur Internet le 5 novembre 2009

Mots clés :

Qnr

Aac (6′)-Ib-cr

Résistance

Entérobactéries

BLSE

Keywords:

Qnr

Aac (6′)-Ib-cr

Resistance

Enterobacteria

ESBL

RÉSUMÉ

But de travail. – Montrer l'émergence des gènes *qnr* chez des entérobactéries résistantes à l'acide nalidixique isolées dans la ville d'Annaba en Algérie.

Matériel et méthodes. – Des souches d'entérobactéries ($n = 25$) résistantes à l'acide nalidixique ont été isolées au laboratoire de microbiologie du centre hospitalier de la ville d'Annaba en Algérie. La résistance aux antibiotiques (méthode de diffusion et CMI) et la détection des bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) ont été réalisées selon les recommandations de la Société française de microbiologie. La caractérisation des gènes de résistance aux quinolones (*qnrA*, *qnrB*, *qnrS*, *aac*(6′)-*Ib-cr*) et des BLSE (TEM, SHV, CTX-M1, CTX-M2, CTX-M8 et CTX-M9) est réalisée par PCR. La PCR multiplex est utilisée pour identifier les bêta-lactamases plasmidique de type AmpC. Tous les produits de PCR ont été séquencés dans les deux sens. Les expériences de conjugaison sont réalisées en utilisant la souche d'*Escherichia coli* K₁₂J₅ résistante à l'azide de sodium comme souche réceptrice.

Résultats. – Parmi les 25 souches sélectionnées, 24 présentent une résistance à au moins quatre antibiotiques. Six souches présentent un phénotype de BLSE. Le gène *qnr* (variant B1) est retrouvé chez deux souches qui sont productrices de BLSE et qui hébergent au moins deux types de gènes bêta-lactamases. Le gène *aac* (6′)-*Ib* est détecté chez trois souches dont une avec le variant *aac*(6′)-*Ib-cr*. Avec des primers spécifiques, nous avons montré que *qnr*B1, CTX-M-28, TEM1, *aac*(6′)-*Ib-cr* été cotransféré ensemble et que ces gènes sont portés par des plasmides conjugatifs de haut poids moléculaire.

Conclusion. – L'émergence de combinaison de gènes de résistance pourrait poser un problème de santé publique. Ainsi, une politique de surveillance de la résistance paraît nécessaire.

© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ABSTRACT

Aim of the study. – To show the emergence of the *qnr* and *aac* (6′)-*Ib-cr* genes in nalidixic acid resistant enterobacteria isolated at Annaba city in Algeria.

Materials and methods. – Enterobacterial strains ($n = 25$) resistant to nalidixic acid have been isolated at the microbiology laboratory of the Annaba city hospital in Algeria. Antibiotic susceptibility (disc diffusion method and MIC) and screening for Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) were performed according to the French Society for Microbiology guidelines. Characterization of quinolone resistance genes (*qnrA*, *qnrB*, *qnrS*, *aac*(6′)-*Ib-cr*) was investigated by PCR. Identification of ESBL (TEM, SHV, CTX-M1, CTX-M2, CTX-M8 and CTX-M9 groups) was performed by PCR. Identification of plasmid AmpC beta-lactamases was performed by multiplex PCR. All PCR products were sequenced on both strands. Conjugation experiments were performed using azide-resistant *Escherichia coli* K₁₂J₅ as a recipient strain.

Results. – Among the 25 strains selected, 24 were resistant to at least four antibiotics. Six strains showed an ESBL phenotype. The *qnr* gene (B1 type) was found in two ESBL producing strains with at least two

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : mohammed.timinouni@pasteur.ma (M. Timinouni).

types of *bla* gene. The *aac* (6′)-*Ib* gene was detected in three strains, one with the *aac* (6′) *Ib*-cr variant. With specific primers, we have shown that *qnrB1*, CTX-M-28, TEM1, *aac* (6′)-*Ib*-cr was cotransferred together and that these genes are carried by conjugative plasmids of high molecular weight.

Conclusion. – The emergence of combination of resistance genes may pose a public health problem. Thus, a policy of surveillance of resistance seems necessary.

© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction

Les quinolones sont des antibiotiques synthétiques, découverte en 1962 par Leshner qui a isolé l'acide nalidixique à partir d'une préparation de chloroquine destinée au traitement du paludisme. Du fait de leur bonne diffusion tissulaire, ces antibiotiques sont largement utilisés en médecine humaine et vétérinaire, notamment dans le cas d'infections urinaires et respiratoires.

Dans les années 1980, la fluoration de ces molécules en position 6 a permis d'étendre leur spectre d'activité selon la génération de la molécule à *Pseudomonas aeruginosa*, aux coques à Gram positif, aux bactéries intracellulaires et aux anaérobies. Parmi ces fluoroquinolones, nous citons la ciprofloxacine, la lévofloxacine et la moxifloxacine. Ces antibiotiques inhibent spécifiquement la synthèse d'ADN bactérien en agissant sur les topoisomérases de type II : l'ADN gyrase formée des sous-unités *GyrA* (cible préférentielle des bactéries à Gram négatif) et *GyrB*, ainsi que la topoisomérase IV, formée des sous-unités *ParC* (cible préférentielle des bactéries à Gram positif) et *ParE*. Le support de la résistance aux quinolones était supposé être uniquement chromosomique jusqu'en 1998 où Martínez-Martínez et al. ont décrit la première souche (*Klebsiella pneumoniae*) dont le support de la résistance est un plasmide transférable (pMG252) [1]. Il a été ensuite démontré que le plasmide pMG252 hébergeait le gène *qnrA* codant pour une protéine, QNR A, de 218 acides aminés appartenant à la famille des protéines à motifs pentapeptidiques répétés qui protège le complexe ADN-gyrase de l'inhibition par les quinolones [2]. Quatre autres déterminants plasmidiques également impliqués dans la résistance aux quinolones ont été rapportés (*qnrB*, *qnrS*, *qnrC* et *qnrD*), ainsi que différents variants des protéines QnrA et QnrB [3–5]. En 2006, un nouveau mécanisme de résistance plasmidique aux quinolones a été décrit chez des souches d'*Escherichia coli* isolées en Chine. Il s'agit d'une inactivation des FQ par acétylation au niveau de l'azote aminé du substituant pipérazinyl. Le déterminant de cette résistance est un variant d'une aminosidase N-acétyltransférase ACC-(6′)-*Ib*-cr dont le gène codant présente deux mutations spécifiques au niveau des codons 103 et 179 entraînant l'inactivation des FQ [6]. Récemment, un nouveau mécanisme de résistance plasmidique aux fluoroquinolones a été découvert, par excréation active des FQ via la pompe d'efflux *qepA* [7,8]. Les mécanismes de résistance plasmidique aux quinolones (PMQR) conduisent à des résistances de bas niveau. Mais leur association aux mécanismes chromosomique augmentent le niveau de résistance sous l'effet d'un traitement thérapeutique par les fluoroquinolones. La co-expression d'autres gènes de multirésistance (*bla*) par des souches porteuses de PMQR et leur dissémination à l'hôpital et dans la communauté est un facteur de risque d'impasse thérapeutique. Pour cette raison, l'étude et le dépistage de ces mécanismes semblent nécessaires. L'objectif principale de ce travail était la recherche des déterminants de la résistance plasmidique aux quinolones : les gènes *qnr* et *aac* (6′)-*Ib*-cr dans des souches d'entérobactéries résistantes à l'acide nalidixique isolées au centre hospitalier de la ville d'Annaba en Algérie.

2. Matériel et méthode

2.1. Souches bactériennes

Les souches d'entérobactéries sélectionnées pour cette étude sont 25 souches cliniques résistantes à l'acide nalidixique collectées au laboratoire de microbiologie du centre hospitalier de la ville d'Annaba, situées à 600 km à l'est d'Alger. La répartition par espèce des souches testées, les dates et les services d'isolement sont présentés dans le Tableau 1.

2.2. Sensibilité aux antibiotiques

L'antibiogramme a été réalisé par la méthode de diffusion des disques sur gélose Mueller-Hinton (BioRad) et interprété après mesure des diamètres d'inhibition en accord avec les recommandations du comité d'antibiogramme de la Société française de microbiologie CA-SFM, (www.sfm.asso.fr).

Les antibiotiques suivants ont été testés : amoxicilline (25 ug), amoxicilline-acide clavulanique (20/10 ug), imipénème (10 ug), céfoxitine (30 ug), céfépime (30 ug), céftazidime (30 ug), céfotaxime (30 ug), aztreonam (30 ug), gentamicine (10 ug), amikacine (30 ug), tobramycine (10 ug), kanamicine (30 ug), acide nalidixique (30 ug), ciprofloxacine (5 ug), tétracycline (30 ug) et triméthoprime sulfaméthoxazole (1,25/23,75). La souche de référence *E. coli* ATCC 25922 a été utilisée comme témoin.

La recherche de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) a été réalisée par la méthode classique basée sur la détection de la

Tableau 1

Origine des souches d'entérobactéries étudiées.

Codes	Souches	Origine	Date d'isolement	Services
[S1]	Kp	Urine	Mars 2006	Endocrinologie
[S2]	Kp	Liquide bronchiale	Juin 2007	ND
[S3]	ECl	Pus	Mars 2006	Endocrinologie
[S4]	Pm	Pus	Janvier 2006	Endocrinologie
[S5]	Pm	Pus	Mars 2007	Chirurgie
[S6]	Pm	Urine	Juin 2007	Urologie
[S7]	Pm	Liquide d'ascite	Mai 2007	Chirurgie
[S8]	Pm	Urine	Mars 2007	Endocrinologie
[S9]	EC	Urine	Avril 2006	Externe
[S10]	Mm	Pus	Novembre 2006	Endocrinologie
[S11]	Pv	Pus	Février 2006	Endocrinologie
[S12]	Pv	Urine	Juin 2006	Chirurgie
[S13]	Pm	Pus	Juin 2006	Endocrinologie
[S14]	ECl	Urine	Juin 2008	Endocrinologie
[S15]	Mm	Urine	Février 2007	Endocrinologie
[S16]	Pv	Pus	Mars 2007	Externe
[S17]	Kp	Pus	Juillet 2008	Externe
[S18]	EC	Sang	Juillet 2008	Chirurgie
[S19]	EC	Urine	Mars 2008	Endocrinologie
[S20]	EC	Urine	Mai 2008	Endocrinologie
[S21]	EC	Urine	Juin 2008	Urologie
[S22]	Pm	Urine	Avril 2008	Externe
[S23]	EC	Pus	Mai 2008	Externe
[S24]	ECl	Urine	Mai 2008	Externe
[S25]	EC	Urine	Juin 2008	Externe

EC : *Escherichia coli* ; ECl : *Enterobacter cloacae* ; Kp : *Klebsiella pneumoniae* ; Mm : *Morganella morganii* ; Pm : *Proteus mirabilis* ; Pv : *Proteus vulgaris*.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/4136224>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/4136224>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)