



Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com



ARTICLE ORIGINAL

Représentations et expérience des pères « primipares » de l'allaitement maternel : lien avec la durée de l'allaitement



Fathers experiences and representations of breastfeeding:
Relationship with breastfeeding duration

F. Noirhomme-Renard*, M. Close, C. Gosset

Département des sciences de la santé publique, université de Liège, avenue de l'Hôpital,
3 bâtiment B23, 4000 Liège, Belgique

Reçu le 11 juin 2014 ; accepté le 31 octobre 2014

MOTS CLÉS

Allaitement
maternel ;
Père

Résumé

Introduction. – Cette recherche visait à explorer les représentations et l'expérience des pères au sujet de l'allaitement maternel (AM).

Patients et méthodes. – Deux groupes de pères ont été recrutés dans l'année qui a suivi la naissance de leur enfant : un groupe dont l'enfant a été allaité moins de trois mois ($n = 16$), et l'autre dont l'enfant a été allaité plus de six mois ($n = 17$). Ils ont été interrogés par entretiens semi-dirigés et ont complété un questionnaire d'attitude envers l'alimentation de l'enfant (IIFAS).

Résultats. – Bien que la représentation qu'avaient les pères de l'allaitement maternel pendant la grossesse différait quelque peu entre les deux groupes, des facteurs médicaux et sociaux sont avant tout associés à un AM court : complications médicales chez la mère ou chez l'enfant, vulnérabilités sociales, difficultés précoces d'allaitement. L'intervention de professionnels de santé a été mentionnée par de nombreux pères en cas de difficultés d'allaitement, mais elle a, dans la majorité des cas, mené à l'échec de l'AM dans la durée. La place accrue que les pères prennent dans la triade, parfois modulée par leur partenaire, et leur implication émotionnelle et pratique dans l'allaitement sont associées à un AM long. Les pères dont le bébé a été allaité plus de 6 mois ont un score davantage en faveur de l'allaitement sur l'échelle IIFAS.

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : florence.renard@ulg.ac.be (F. Noirhomme-Renard).

KEYWORDSBreastfeeding;
Father

Conclusion. – L'inclusion des pères dans le modèle compréhensif des déterminants de l'allaitement apporte un éclairage complémentaire aux facteurs déjà identifiés.
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Introduction. – This study aim to investigate fathers experiences and representations in regard to breastfeeding.

Methods. – Two groups of fathers were recruited in the year following the birth of their child: a group whose child was breastfed less than three months ($n = 16$), and the other whose child was breastfed more than 6 months ($n = 17$). They were interviewed by semi-structured interviews and completed a questionnaire of attitudes toward child feeding (IIFAS).

Results. – Although the representation that had fathers of breastfeeding during pregnancy differed somewhat between the two groups, medical and social factors are primarily associated with a short AM: medical complications in the mother or the child, social vulnerabilities, early breastfeeding difficulties. The involvement of health professionals has been mentioned by many fathers when breastfeeding difficulties, but it has, in most cases, led to the failure of AM in time. Increased fathers take place in the triad, sometimes modulated by their partner, and their emotional involvement and practice in breastfeeding are associated with long AM. Fathers whose baby was breastfed for more than 6 months have a score more in favor of breastfeeding on the scale IIFAS.

Conclusion. – The inclusion of fathers in the comprehensive model of the determinants of breastfeeding provides further insight to the factors already identified.

© 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

La promotion de l'allaitement maternel (AM) est une stratégie importante de promotion de la santé de l'enfant. À court et à long termes, les bénéfices de l'allaitement sont nombreux, tant pour l'enfant que pour la mère [1]. L'OMS et l'UNICEF recommandent un allaitement maternel exclusif durant les six premiers mois de vie de l'enfant et un allaitement complété jusqu'à 2 ans. Même si les taux d'initiation de l'allaitement progressent en Belgique comme en France, les taux d'allaitement prolongés jusqu'à six mois restent bien en deçà des recommandations. Les facteurs en jeu dans le succès de l'allaitement se situent à différents niveaux et sont largement décrits [2]. Parmi eux, un ressort: le rôle des pères. Plusieurs études ont montré que les pères avaient un rôle influent dans la prise de décision des femmes d'allaiter leur enfant [3–5], et que leur soutien était crucial pour le succès de l'allaitement [6,7]. Cependant, peu de recherches ont exploré le regard et le rôle des pères au sujet de l'allaitement même si Winnicott, en 1957 déjà, s'est intéressé au rôle du père comme « protecteur du lien mère-enfant » [8].

Cette recherche vise à explorer les représentations et l'expérience des pères de l'allaitement maternel, en distinguant les pères dont le bébé a été allaité moins de trois mois (groupe « AM court ») de ceux dont l'enfant a été allaité plus de six mois (groupe « AM long »).

Participants et méthodes**Population**

L'échantillon est composé d'hommes devenus pères pour la première fois entre janvier 2010 et janvier 2011 et dont l'enfant a été allaité exclusivement ou non. Deux groupes de pères ont été recrutés: un premier groupe dont la conjointe a cessé l'allaitement maternel avant 3 mois ($n = 16$), ce qui correspond à un sevrage « précoce »; un deuxième groupe dont la conjointe a allaité au moins 6 mois (allaitement exclusif ou partiel, $n = 17$), ce qui correspond à la période recommandée d'allaitement maternel exclusif.

Les critères d'inclusion étaient les suivants: être devenu père pour la première fois entre janvier 2010 et janvier 2011; avoir une bonne maîtrise du français; vivre avec la mère et l'enfant; la grossesse a été normale et l'accouchement eutocique; l'enfant est né à terme et en bonne santé (âge gestationnel > 38 semaines, poids de naissance > 2500 g, séjour de moins de 24 h en néonatalogie); l'enfant est rentré à la maison depuis 15 jours minimum.

Les pères ont été recrutés via les consultations pour nourrissons de l'office de la naissance et de l'enfance (ONE, service équivalent en Belgique francophone des services PMI de protection maternelle et infantile en France). Pour éviter un biais de sélection, les pères n'ont pas été informés du thème de l'allaitement lors du recrutement mais du thème

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/4169680>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/4169680>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)