

## PSYCHOPATHOLOGIE

# Contribution des traits psychopathiques aux comportements délinquants dans un échantillon de garçons adolescents scolarisés

## *Contribution of psychopathic traits to delinquent behaviors in a sample of high-school male students*

C. Saint-Martin, H. Chabrol\*

Centre d'études et de recherches en psychopathologie, université de Toulouse–Le-Mirail, 5, allées Antonio-Machado, 31052 Toulouse, France

Reçu le 26 février 2008 ; accepté le 30 janvier 2009

Disponible sur Internet le 22 avril 2009

### MOTS CLÉS

Comportements antisociaux ;  
Traits psychopathiques ;  
Traits limites  
consommation de cannabis ;  
Symptômes dépressifs ;  
Adolescents

### KEYWORDS

Antisocial behaviour;  
Psychopathic traits;  
Borderline traits;

**Résumé** L'objectif de cette étude est d'évaluer les contributions relatives des traits de personnalité psychopathiques et limites, de la dissociation, des symptômes dépressifs et des consommations d'alcool et de cannabis aux comportements délinquants des garçons adolescents. Cent cinquante-cinq adolescents et jeunes adultes scolarisés ont rempli des auto-questionnaires. Après avoir évalué à quelle fréquence ces adolescents ont commis des actes délinquants, une analyse de régression multiple dans l'échantillon total a montré que seules les consommations d'alcool et de cannabis et la dureté psychologique, trait de personnalité psychopathique, influençaient les comportements antisociaux.

© L'Encéphale, Paris, 2009.

**Summary** The aim of this study was to evaluate the contribution of psychopathic personality traits to delinquent behaviour after controlling for borderline personality traits, depressive symptomatology, dissociation and cannabis use in male adolescent delinquent behaviour.

**Method.** – A sample of 155 young male participants (mean age =  $17 \pm 1.5$ ) completed self-report questionnaires. Delinquent behaviour was assessed with the Antisocial behavior scales (ABS, Schwab-Stone et al., 1999) which include three subscales assessing behavior problems of different severity: conduct problems, assessing relatively mild behavior problems; less severe

\* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [chabrol@univ-tlse2.fr](mailto:chabrol@univ-tlse2.fr) (H. Chabrol).

Cannabis use depressive  
and dissociative  
symptoms;  
Adolescents

delinquency, assessing non-violent antisocial behavior; severe antisocial behavior, exploring relatively serious aggressive and antisocial behavior. The respondents were asked to report on a 5-point scale how many times (ranging from "0 times" to "5 or more times") they were involved in the described behaviors during the past year. In this study, only the two subscales assessing less severe delinquency and severe antisocial behavior were used. Personality psychopathic traits were assessed with the Youth psychopathic traits inventory (YPI; Andershed et al., 2002). It consists in three scales assessing interpersonal, affective (with callousness, which is considered as the core dimension of a psychopathy) and lifestyle traits of the psychopathic personality ( $\alpha = 0.90$ ,  $\alpha = 0.81$  and  $\alpha = 0.77$ , respectively). Other questionnaires assessed borderline personality traits (Borderline personality features scale for children), depression (Center for epidemiological studies-depression scale), dissociation (Adolescent dissociative experience scale) ( $\alpha = 0.83$ ,  $0.88$  and  $0.92$  respectively) and cannabis use.

**Results.** – In the present study, the frequency of antisocial behaviour was important (55%): 7% of the adolescents had stolen a bike or a car at least once, 11% had committed a theft at least once, 36% had started a fight at least once, and 25% had threatened someone seriously or beaten up somebody at least once, 15% had had hurt someone badly in a physical fight so they had to be treated by a doctor or a nurse at least once, 21% had carried a blade, knife or gun at least once, 9% had been involved in a gang fight at least once, and 12% had carried a blade, knife or gun in school. A multiple regression analysis predicting antisocial behaviour in the total sample with the psychopathic and borderline traits, depressive and dissociative symptoms, alcohol and cannabis use, showed that delinquent behaviours were only predicted by alcohol and cannabis use and the psychopathic trait "callousness".

**Discussion.** – This study suggests the importance of callousness in explaining adolescent delinquent behaviour. Other psychopathological variables did not appear to influence delinquent behaviour in this sample.

© L'Encéphale, Paris, 2009.

## Introduction

Les comportements antisociaux de l'adolescent sont liés à de nombreux facteurs, principalement psychosociaux. Différentes études reconnaissent les relations existantes entre les comportements antisociaux et la dépression [13,14], la dissociation [3], la personnalité limite [10] et la consommation de cannabis [12] et d'alcool [2]. Plusieurs études ont montré la fréquence des traits de personnalités psychopathiques chez les adolescents délinquants et dans la population générale des adolescents [6,7]. Les jeunes délinquants ayant des traits de personnalité psychopathique avaient des conduites délinquantes plus nombreuses, plus variées et plus sévères [7]. Frick et al. ont mis en avant que la présence de traits psychopathiques était prédictive de la sévérité et de la stabilité des troubles des conduites chez l'enfant [8].

Bien que ces différents facteurs psychopathologiques soient associés entre eux, peu d'études ont tenté de dégager leur contribution indépendante. En particulier, selon une interrogation *Medline* et *PsycInfo*, aucune étude n'a évalué le rôle indépendant des traits psychopathiques en contrôlant les principales variables psychopathologiques associées. Le but de cette étude est d'évaluer la contribution aux comportements délinquants des traits de personnalité psychopathiques en contrôlant les autres variables psychopathologiques, les traits de personnalité limite, les symptômes dépressifs, les symptômes de dissociation et de la consommation de cannabis.

## Méthode

Cent cinquante-cinq adolescents garçons, (âge moyen =  $17 \pm 1,5$ ) scolarisés ont rempli six auto-questionnaires après avoir donné leur consentement éclairé.

Les comportements délinquants ont été évalués par l'*Antisocial behaviour scales* (ABS) [15]. Ce questionnaire permet de mesurer trois dimensions des troubles des conduites: le non-respect des règles, la délinquance mineure et les comportements antisociaux sévères. Les sujets devant indiquer à quelle fréquence ils ont vécu les expériences proposées au cours de l'année écoulée en se positionnant sur une échelle allant de zéro (jamais) à 5+ (cinq fois et plus). Dans cette étude, seulement les deux échelles évaluant la délinquance mineure et la délinquance sévère ont été utilisées, soit huit items (alpha de Cronbach = 0,85 dans cet échantillon). Les questionnaires sont considérés comme des moyens fidèles d'évaluer les comportements antisociaux et délinquants des adolescents [5]. Le questionnaire ABS contient un item évaluant l'usage de l'alcool: combien de fois as-tu été en classe après avoir bu de l'alcool? ». L'usage d'alcool a été évalué par cet item (qui ne faisait pas partie des huit items évaluant les délinquance mineure et sévère). L'usage du cannabis dans les six derniers mois a été évalué par l'échelle en neuf points de Simons et al. allant de zéro (pas de consommation) à huit (consommation plus d'une fois par jour) [16].

Les traits psychopathiques ont été évalués avec la version française de l'*Youth psychopathic traits inventory*

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/4182091>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/4182091>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)