



Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com



Prise en charge et gestion des patients demandeurs d'un lifting cervico-facial

Care and optimal management of the face- and neck-lift patients

E. Delay ^{a,*,b,c}

^a Clinique Charcot, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, France

^b Cabinet privé, 50, rue de la République, 69002 Lyon, France

^c Centre Léon-Bérard, 28, rue Laennec, 69008 Lyon, France

MOTS CLÉS

Lifting cervico-facial ;
Rajeunissement facial ;
Information ;
Sélection des patientes

Résumé La prise en charge chirurgicale et la gestion des patients demandeurs d'un lifting cervico-facial sont très importantes. Le but de ce travail est de présenter les informations et recommandations nécessaires, pour aider le chirurgien plasticien à offrir une prise en charge de qualité au patient demandeur de lifting cervico-facial. La consultation initiale est l'étape la plus importante. Le questionnaire préopératoire aide à définir la demande et à évaluer les contre-indications opératoires. L'examen clinique et l'analyse précise de la demande du patient permettent de construire une proposition thérapeutique précise, qui est confrontée aux attentes et désirs du patient. Cette confrontation permet de recommander s'il est opportun ou non d'opérer. L'information précise sur l'intervention fait partie intégrante de cette consultation, à l'issue de laquelle seront remises les fiches d'information de la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice, et esthétique (SOFCPRE) correspondant aux gestes particuliers envisagés chez le patient. La deuxième consultation permet de vérifier la pertinence de l'intervention, de redonner les consignes préopératoires importantes, de confirmer que l'information a bien été comprise, et permet enfin de recueillir le consentement écrit des patients. Dans ce consentement doit apparaître clairement que le patient a bien reçu le ou les fiches correspondantes de la SOFCPRE, qu'il a bien lues et comprises, et qu'il a ainsi été bien informé, lui permettant de choisir librement de réaliser l'intervention. Après l'intervention, le suivi postopératoire est tout aussi important pour bien accompagner les patients. Dans certains cas, des gestes de médecine esthétique peuvent être pratiqués dans les mois postopératoires, pour aider à obtenir le meilleur résultat possible, et la meilleure satisfaction possible. Le lifting cervico-facial est une « aventure » considérable pour les patients, et les difficultés postopératoires ne doivent pas être sous-estimées. Cependant, l'accompagnement bienveillant et professionnel du chirurgien plasticien, et l'accompagnement par une personne bienveillante de l'entourage du patient, permettront d'aider le patient à passer cette étape, et de bénéficier de l'apport majeur pour le patient, que représente habituellement cette intervention.

© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

* Correspondance.

Adresse e-mail : emmanuel.delay@lyon.unicancer.fr.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.anplas.2017.06.004>

0294-1260/© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS

Face-lift;
Neck-lift;
Information;
Patient care;
Facial rejuvenation;
Information
consent forms;
Patient's selection

Summary Surgical and case management for patients demanding a face- and neck-lift are very important. The purpose of this paper is to help the plastic surgeons with information and recommendations useful for the best medical care of patients requiring a face- and neck-lift. The first consultation is the most important contact with the patient. The preoperative discussion helps to define patient demands and to evaluate eventual contraindications for surgery. The clinical exam and patient requirements are useful in the construction of the therapeutic proposition. This proposition is then confronted with patients' expectations and demands. The confrontation between the surgical proposition and patients' expectations allows to evaluate if it is appropriate, or not, to operate. At the end of the first consultation, the patient receives the information sheets of the French Plastic Surgery Society (SOFCPRE) according to the proposed surgical treatment. The second consultation makes it possible to verify the pertinence of the surgical act, to reiterate the preoperative recommendations, to confirm that the information given to the patient was well understood and to obtain the written consent from the patient. The written consent should include the fact that the patient received the information sheets of the SOFCPRE, that they were read and understood, and that the surgeon has transmitted the necessary information in order for the patient to take an informed and free decision to pursue with the surgery. The follow-up after surgery is as important as the surgery itself. In some cases, cosmetic gestures can be performed in the following months to obtain the best results possible and the highest satisfaction. The face- and neck-lift is an "adventure" for the patients and the postoperative difficulties should not be underestimated. However, the caring and professional support of the plastic surgeon and the support of someone of the patients' entourage can help the patient overcome this stage, and obtain a maximum benefit after this operation.

© 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

La prise en charge chirurgicale et la gestion des patients demandeurs d'un lifting cervico-facial sont souvent aussi importantes que la réalisation de la chirurgie elle-même [1–4]. De même, le suivi dans la période postopératoire peut faire la différence entre un succès (une patiente rajeunie et satisfaite) et un échec (une patiente déçue et non satisfaite).

Il est d'abord essentiel que le chirurgien plasticien puisse comprendre les vrais désirs des patients. Une fois que le chirurgien a compris les désirs de la patiente ou du patient, le chirurgien va estimer la probabilité de succès de la chirurgie pour obtenir satisfaction et, ceci, d'après sa propre expérience. Il est important de discuter avec soin, de cela, avec le patient.

Le chirurgien plasticien, peut-être plus encore que les autres médecins, doit utiliser son imagination, son habileté et son jugement pour obtenir le meilleur résultat possible pour chaque patient. Les patients consultant en chirurgie plastique du visage sont très sensibles à notre attention pour des détails, parfois subtiles, et également à notre application et notre délicatesse dans la période postopératoire [1–3].

Ce chapitre vise à présenter les informations et recommandations utiles pour aider à offrir bienveillance, sécurité, et qualité dans la prise en charge des patients demandeurs de lifting cervico-facial.

Consultation initiale

Comme nous l'avons signalé dans l'introduction, il est essentiel de sélectionner les bons patients pour chaque chirurgie envisagée. L'adhésion au plan de consultation devrait aider à obtenir une sélection adéquate, et permettre une prise en charge optimale des patients.

Questionnaire avant consultation

Un questionnaire peut être adressé avant la consultation, en même temps que la confirmation du rendez-vous. Ceci permet au chirurgien de l'avoir lors de la consultation. D'autres chirurgiens préfèrent le remettre à l'arrivée du patient, et le faire compléter en salle d'attente. Ce questionnaire doit être rempli avec soin par le patient et permet de connaître des détails qui peuvent être très importants comme : une affection médicale sérieuse, le tabagisme, des allergies et notamment une allergie au latex, la prise de médicaments, les antécédents chirurgicaux, notamment au niveau de la face, et d'autres informations comme la notion d'hypertension artérielle (HTA). Il est en effet essentiel de déterminer le niveau de santé générale du patient, spécialement en matière cardiovasculaire, avec les antécédents coronariens ou les antécédents d'HTA, de saignement important ou/ d'hématome. Aspirine ou anti-inflammatoires peuvent causer des saignements anormaux, il est précisé alors à ce moment-là au patient, de bien éviter la prise de ce type de médicaments une dizaine de jours avant la chirurgie. Il est rappelé l'arrêt impératif du tabagisme 1 mois avant et 1 mois après l'intervention, et si possible définitivement pour la santé future du patient.

État général et examen clinique

Dans l'examen général, il est important de connaître la taille et surtout le poids du patient. La connaissance du poids du patient est en effet fondamentale car si le patient est en surpoids, il doit bien comprendre qu'il faut qu'il perde du poids avant l'intervention pour sa santé générale, mais également pour maintenir le bénéfice de l'intervention de lifting. Il est fondamental que le patient comprenne qu'il ne doit pas perdre de poids après un lifting cervico-facial car

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/5644478>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/5644478>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)