



Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com



Lifting de la lèvre supérieure

Upper lip lift



B. Cornette de Saint Cyr^{*}, H. Prevot

15, rue Spontini, 75116 Paris, France

MOTS CLÉS

Lèvre supérieure ;
Raccourcissement lèvre
supérieure ;
Rajeunissement lèvre
supérieure ;
Lifting lèvre supérieure

KEYWORDS

Upper lip;
Upper lip shortening;
Upper lip rejuvenation;
Upper lip lift

Résumé L'auteur revisite une technique ancienne de raccourcissement de la lèvre supérieure. Il montre l'intérêt d'analyser systématiquement la longueur de la lèvre supérieure dans toute consultation de visage et surtout de rajeunissement. Il développe les indications basées sur la visibilité des incisives supérieures au repos bouche entrouverte. Il détaille la technique et montre des résultats.

© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary The author revisits an old technique of shortening of the upper lip. He shows the interest of systematically analyzing the length of the upper lip in any consultation of face and especially of rejuvenation. He develops indications based on the visibility of the upper incisors at the half-open mouth rest. He details the technique and shows results.

© 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

La lèvre supérieure est la partie supérieure de la bouche située sous la pyramide nasale.

Anatomiquement, elle est divisée en deux parties : la « lèvre blanche » recouverte de peau et la « lèvre rouge » correspondant à la partie sèche et visible de la muqueuse buccale. La muqueuse se prolonge à l'intérieur de la bouche en muqueuse humide enrobant le muscle orbiculaire, sphincter très mobile. Les proportions anthropométriques de la lèvre supérieure et du processus de vieillissement ont été bien établies, principalement par Gonzalez-Ulloa dans les années 1970 [1].


Une perte de proéminence des crêtes philtrales ainsi qu'une perte de volume du bord vermillon est également induite lors du processus de vieillissement [2].

Lorsqu'on observe dans les magazines de beauté, dans les œuvres d'art de toutes périodes ou dans la vie, on remarque sur les visages jeunes et harmonieux que la hauteur cutanée est toujours courte : 9 à 14 mm. Il est intéressant de noter que cette caractéristique est indépendante des origines et de la période.

Chez les jeunes femmes, la lèvre supérieure est le plus souvent courte et lorsqu'elles entrouvrent les lèvres, on peut entrevoir les dents, notamment, la partie basse des incisives supérieures. L'expression est alors « sexy ». Ce

^{*} Auteur correspondant.

Adresse e-mail : bdesaintcyr@outlook.com (B. Cornette de Saint Cyr).



Figures 1–6 Exemples de jeunes femmes d’origines et d’époques différentes montrant l’universalité de la lèvre supérieure.

phénomène est indépendant du caractère charnu ou fin de la lèvre muqueuse. Quelle qu’elle soit, la lèvre peut garder tout son pouvoir de séduction, sachant que la bouche est un organe de communication par la parole, un organe de séduction par sa beauté, un organe de survie par l’alimentation et un organe sexuel : le seul organe sexuel découvert (Fig. 1–6).

Chez certains individus, quel que soit l’âge, la lèvre supérieure est génétiquement trop longue et inesthétique.

Dans de nombreux cas, l’évolution de cette lèvre supérieure est la suivante (Fig. 7).

Avec le vieillissement, la lèvre supérieure blanche s’allonge, s’affine, recule, s’atrophie, se ride et la lèvre supérieure rouge s’affine, cachant ainsi les incisives lorsque la bouche est légèrement ouverte (Fig. 8–10).

Sans tomber dans la recherche du nombre parfait, lorsqu’on analyse un visage en quête d’amélioration, il est essentiel de tenir compte du paramètre labial et d’étudier les différents niveaux du visage afin de respecter ou de restaurer une harmonie parfois disparue.

Chez la jeune femme, la distance naso-labiale est plus courte que la hauteur de la lèvre inférieure et du menton. Chez la femme âgée, c’est le contraire.

La grande mode des injections labiales peut faire des merveilles mais peut aussi, si on ne tient pas compte de cet équilibre, aggraver la situation lorsqu’on injecte et alourdit une lèvre déjà trop longue aboutissant à une morphologie simiesque [3,4] (Fig. 11).

Notre propos concernera la partie cutanée entre les narines et le bord mucocutané appelé arc de cupidon. Il

ne concernera la partie muqueuse que lorsqu’il s’agira de réduire le volume d’une lèvre trop injectée de produits permanents. Bien que cela ne se fasse plus actuellement, nous savons qu’il persiste un nombre important de patientes injectées de silicone avant l’interdiction [5,6].

La chirurgie

Que peut faire le chirurgien plasticien ?

Après une analyse soignée du visage et, si possible, d’une comparaison avec des photos de jeunesse de la patiente ou du patient (cette chirurgie concerne aussi les hommes), le chirurgien peut soit s’abstenir si la lèvre présente une proportion satisfaisante, soit proposer une chirurgie qui tentera de réduire la hauteur de la lèvre supérieure afin de rétablir des proportions harmonieuses qui permettra de mettre les dents et le sourire en valeur, ce qui n’est pas constant si les dents sont courtes.

L’état dentaire étant primordial, le chirurgien-dentiste aura son rôle à jouer en améliorant l’état des dents, si, celles-ci sont abîmées ou en rallongeant les incisives, si, malgré l’opération, les dents courtes restent cachées.

Finalité

Le but de l’opération est de raccourcir la hauteur de la lèvre supérieure.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/5644490>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/5644490>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)