Journal français d'ophtalmologie (2017) 40, 477—486

Disponible en ligne sur ScienceDirect www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France EM|consulte www.em-consulte.com

ARTICLE ORIGINAL

Perception du glaucome et observance thérapeutique : une étude observationnelle multicentrique

Info.suppl.

Perception of glaucoma and therapeutic adherence: A multicenter observational study

A. Chiche[a], G. Martin[c], E. Brasnu de Cenival[a,b], A. Rousseau[e], A. Giocanti[f], A. Fel[g], S. Kallel[a,b,c], M. Lombardi[b], P. Hamard[a,b], C. Baudouin[a,b,c,d], A. Labbe[a,*,b,c,d]

[a] *Service d'ophtalmologie 3, Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, 28, rue de Charenton, 75012 Paris, France*
[b] *DHU Sight Restore, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, France*
[c] *Service d'ophtalmologie, hôpital Ambroise-Paré, AP—HP, 9, avenue Charles-De-Gaulle, 92100 Boulogne-Billancourt, France*
[d] *Inserm, U968, CNRS, UMR 7210, institut de la vision, université UPMC Paris VI, 75012 Paris, France*
[e] *Service d'ophtalmologie, hôpital Kremlin-Bicêtre, DHU Sight Restore, AP—HP, 78, rue du Général-Leclerc, 94275 Le Kremlin-Bicêtre, France*
[f] *Service d'ophtalmologie, hôpital Avicenne, DHU Sight Restore, AP—HP, 125, rue de Stalingrad, 93000 Bobigny, France*
[g] *Service d'ophtalmologie, hôpital de la Salpêtrière, AP—HP, 47-83, boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris, France*

Reçu le 25 octobre 2016 ; accepté le 19 janvier 2017
Disponible sur Internet le 30 mai 2017

MOTS CLÉS
Glaucome ;
Observance ;
Questionnaire ;

Résumé
Introduction. — L'objectif de cette étude était d'évaluer, à l'aide du questionnaire « Glaucoma treatment compliance assessment tool (GTCAT) », l'observance thérapeutique des patients glaucomateux et de la corréler aux paramètres cliniques de la maladie.

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : alabbe@15-20.fr (A. Labbe).

http://dx.doi.org/10.1016/j.jfo.2017.01.009
0181-5512/© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Qualité de vie ;
Collyres
hypotonisants

Patients et méthodes. — Il s'agissait d'une étude observationnelle prospective multicentrique réalisée au sein du département hospitalo-universitaire (DHU) Sight Restore, Paris, France. Tous les patients étaient suivis pour un glaucome chronique à angle ouvert (GCAO) depuis au moins 3 ans. Une version française du GTCAT a été soumise aux patients. Les résultats ont été corrélés aux paramètres cliniques comme la durée d'évolution de la maladie, les traitements utilisés, la pression intraoculaire (PIO) et la déviation moyenne (MD) du dernier champ visuel.
Résultats. — Soixante-treize patients ont été inclus dans cette étude. Parmi ces patients, 60,9 % se déclaraient parfaitement observant. Il existait une corrélation positive entre le nombre de jours de non-prise des collyres et la difficulté à mettre les collyres. La cause principale de non-prise des collyres était l'oubli (75 %) suivie par l'indisponibilité du collyre au moment de la prise (37,5 %). L'impact du glaucome sur la qualité de vie était corrélé à l'importance des effets secondaires des traitements locaux. Enfin, le niveau d'importance que le patient accordait à la nécessité de préserver sa vision était corrélé positivement au niveau de confiance que celui-ci accordait au médecin concernant le diagnostic.
Conclusion. — Chez les patients glaucomateux, l'utilisation du GTCAT a confirmé la relation complexe qui existe entre le patient, sa maladie et son traitement, et même sa relation avec l'ophtalmologiste. Ces résultats permettent d'insister sur l'importance de l'éducation thérapeutique mais aussi sur le rôle des effets secondaires des traitements dans l'observance thérapeutique des patients glaucomateux.
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS
Glaucoma;
Adherence;
Questionnaire;
Quality of life;
Glaucoma drops

Summary
Introduction. — The purpose of this study was to evaluate medication adherence of glaucoma patients through the ''Glaucoma treatment compliance assessment tool (GTCAT)'' questionnaire and to correlate the results with clinical parameters.
Patients and methods. — This multicenter prospective observational study was performed in the *Département hospitalo-universitaire* (DHU) Sight Restore, Paris, France. All patients had been followed for chronic open angle glaucoma (COAG) for at least 3 years. A French version of the GTCAT questionnaire was administered to patients. The results were correlated with clinical parameters of glaucoma, such as duration of disease, medications used, intraocular pressure (IOP) and mean deviation (MD) of the most recent visual field.
Results. — Seventy-three patients were included in our study, with 60.9% declaring that they fully adhered to the treatment. There was a correlation between the amount of days missing treatment and difficulties using the eye drops. The main cause of missing the drops was forgetfulness (75%), followed by unavailability of the drop when it was time to take it (37.5%). The impact of glaucoma on quality of life was correlated to the amount of adverse effects of topical medications. The patient's perception of the importance of preserving vision was correlated to the level of confidence in the physician concerning the diagnosis of glaucoma.
Conclusion. — In glaucoma patients, the use of the GTCAT questionnaire confirmed the complex relationship between the patient, the disease and its treatment, and even his or her relationship with the ophthalmologist. These results emphasized the importance of therapeutic education but also the negative role of side effects of the eye drops on treatment adherence in glaucoma patients.
© 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

L'observance thérapeutique est un élément crucial dans la prise en charge du glaucome [1]. Les traitements antiglaucomateux locaux en collyres sont utilisés par 86 % des patients atteints de glaucome [2] et les patients sont traités sur une période moyenne de 15 ans [3]. Ce traitement médical est efficace pour réduire la pression intraoculaire (PIO), il permet de ralentir la dégradation du champ visuel et préserve ainsi la qualité de vie des patients [4]. Malgré l'efficacité démontrée de ce traitement [5], l'observance thérapeutique demeure cependant mauvaise. Une étude a ainsi montré que seuls 56 % des patients glaucomateux utilisaient plus de 75 % des doses prescrites [6]. Cette mauvaise observance entraîne une perte d'efficacité importante du traitement médical et représente un risque

Download English Version:

https://daneshyari.com/en/article/5704753

Download Persian Version:

https://daneshyari.com/article/5704753

Daneshyari.com