



Acta Otorrinolaringológica Española

www.elsevier.es/otorrino



ARTÍCULO DE REVISIÓN

Lesiones otorrinolaringológicas secundarias al sexo oral[☆]

Claudia Fernández-López y Carmelo Morales-Angulo^{*}

Servicio de Otorrinolaringología, Facultad de Medicina, Universidad de Cantabria, HUMV Santander, IDIVAL, Cantabria, Santander, España

Recibido el 2 de marzo de 2016; aceptado el 17 de abril de 2016

PALABRAS CLAVE

Otorrinolaringología;
Enfermedades de
transmisión sexual;
Papilomatosis
laríngea;
Abusos sexuales;
Cavidad oral;
Faringe;
Laringe;
Cavidad nasal;
Boca;
Hipoacusia

Resumen

Introducción: En los últimos años han aumentado de manera significativa las manifestaciones orales y faríngeas secundarias a la práctica de sexo oral. Sin embargo, no hemos encontrado ningún artículo de revisión relacionado con el tema en la literatura médica.

El objetivo de nuestro estudio fue identificar las manifestaciones otorrinolaringológicas asociadas al contacto orogenital/oroanal tanto en pacientes adultos como en niños en el contexto de sexo consentido o de abusos sexuales.

Métodos: Se realizó una revisión de la bibliografía de la patología otorrinolaringológica asociada a la realización de sexo oral en la base de datos PubMed publicada en los últimos 20 años.

Resultados: Las manifestaciones otorrinolaringológicas secundarias a práctica de sexo oral en adultos pueden ser infecciosas, tumorales o traumáticas. Las manifestaciones infecciosas más frecuentes encontradas en la literatura son la infección por el virus del papiloma humano (sobre todo, condilomas acuminados y papilomas), sífilis oral o faríngea, faringitis gonocócica, faringitis por *Chlamydia trachomatis* e infecciones por el virus del herpes simple. Por otra parte, ha aumentado de forma alarmante la incidencia de carcinoma orofaríngeo secundario al virus del papiloma humano.

En niños, fuera del periodo neonatal, la presencia de condilomas acuminados, sífilis, gonorrea o equimosis en el paladar (esta última no justificada por otras causas) nos deben hacer sospechar la presencia de abusos sexuales.

Conclusiones: El cambio de los hábitos sexuales en países occidentales ha dado lugar a la aparición de patologías otorrinolaringológicas excepcionales previamente, por lo que es importante su conocimiento por parte de los médicos de atención primaria para realizar un correcto

[☆] Este artículo ha sido presentado como trabajo de fin de grado de la autora principal.

^{*} Autor para correspondencia.

Correos electrónicos: cmorales@humv.es, carmelo.morales@unican.es (C. Morales-Angulo).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.otorri.2016.04.003>

0001-6519/© 2016 Elsevier España, S.L.U. y Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Todos los derechos reservados.

Cómo citar este artículo: Fernández-López C, Morales-Angulo C. Lesiones otorrinolaringológicas secundarias al sexo oral. Acta Otorrinolaringol Esp. 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.otorri.2016.04.003>

KEYWORDS

Otolaryngology;
Sexually transmitted
diseases;
Laryngeal
papillomatosis;
Oral cavity;
Sexual abuse;
Pharynx;
Larynx;
Nasal cavity;
Mouth;
Hearing loss

diagnóstico y tratamiento posterior. Por otra parte, algunos casos de abusos sexuales en niños pueden ser sospechados gracias al conocimiento de las manifestaciones características orofaríngeas secundarias a los mismos.

© 2016 Elsevier España, S.L.U. y Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Todos los derechos reservados.

Otorhinolaryngology manifestations secondary to oral sex

Abstract

Introduction: Over the last few years, oral and pharyngeal signs and symptoms due to oral sex have increased significantly. However, no review articles related to this subject have been found in the medical literature.

The objective of our study was to identify otorhinolaryngological manifestations associated with orogenital/oroanal contact, both in adults and children, in the context of consensual sex or sexual abuse.

Methods: We performed a review of the medical literature on otorhinolaryngological pathology associated with oral sex published in the last 20 years in the PubMed database.

Results: Otorhinolaryngological manifestations secondary to oral sex practice in adults can be infectious, tumoral or secondary to trauma. The more common signs and symptoms found in the literature were human papillomavirus infection (above all, condyloma acuminata and papilloma/condyloma), oral or pharyngeal syphilis, gonococcal pharyngitis, herpes simplex virus infection and pharyngitis from Chlamydia trachomatis. The incidence of human papillomavirus-induced oropharyngeal carcinoma has dramatically increased.

In children past the neonatal period, the presence of condyloma acuminatus, syphilis, gonorrhoea or palatal ecchymosis (the last one, unless justified by other causes) should make us suspect sexual abuse.

Conclusions: Sexual habits have changed in the last decades, resulting in the appearance of otorhinolaryngological pathology that was rarely seen previously. For this reason, it is important for primary care physicians to have knowledge about the subject to perform correct diagnosis and posterior treatment. Some sexual abuse cases in children may also be suspected based on the knowledge of the characteristic oropharyngeal manifestations secondary to them.

© 2016 Elsevier España, S.L.U. and Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. All rights reserved.

Introducción

En consonancia con los cambios de comportamiento en las relaciones sexuales en los últimos años, se han visto incrementadas de manera importante las manifestaciones otorrinolaringológicas relacionadas con la práctica del sexo oral, tanto las de origen infeccioso como traumático o tumoral. Aunque es muy conocida la relación entre la infección del virus del papiloma humano y el desarrollo de carcinoma orofaríngeo, son mucho menos conocidas otras manifestaciones relacionadas con el sexo oral consentido o secundario a abusos sexuales, sobre todo en niños¹⁻³.

En una revisión de la literatura médica no hemos encontrado ningún artículo de revisión que realice una evaluación global de todas las manifestaciones otorrinolaringológicas relacionadas con el comportamiento sexual y, concretamente, con el sexo oral.

El objetivo de nuestro estudio fue realizar un estudio de revisión de las manifestaciones otorrinolaringológicas relacionadas con la práctica sexual orogenital, tanto en adultos como en niños, en el contexto de sexo consentido o tras

abusos sexuales, y proponer un protocolo diagnóstico ante la sospechas de lesiones que aparecen en el contexto de las mismas.

Métodos

Se realizó una revisión de la literatura de las manifestaciones otorrinolaringológicas descritas asociadas al sexo oral, en la base de datos PubMed, utilizando las palabras clave: «otolaryngology», «ear», «ear auricle», «larynx», «pharynx», «trachea», «nose», «hearing loss», «vértigo», «facial paralysis», «oral manifestations» and «pharyngeal manifestations», combinadas con «oral sex», «sexual behavior», «child abuse, sexual» «syphilis», «*Treponema pallidum*», «*Chlamydia trachomatis*», «gonorrhoea». A su vez se revisó la bibliografía de los artículos que hacían referencia a manifestaciones otorrinolaringológicas relacionadas con el sexo oral para completar el estudio.

Se propone un protocolo diagnóstico de sospecha de lesiones otorrinolaringológicas relacionadas con actividades sexuales tanto en adultos como en niños.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/5713555>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/5713555>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)