




ELSEVIER

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

ScienceDirect

et également disponible sur www.em-consulte.com



Article original

Structure factorielle et qualités psychométriques de la version française du questionnaire d'auto-description pour adultes (*adult self-report*) d'Achenbach et Rescorla

Factor structure and psychometric properties of the French version of the Achenbach and Rescorla's adult self-report

S. Mahr, J.M. Petot*, N. Camart, R. Zebdi

Laboratoire de psychologie clinique EvaCliPsy (EA 4430), département de psychologie, université de Paris Ouest Nanterre, 200, avenue de la République, 92001 Nanterre cedex, France

INFO ARTICLE

Historique de l'article :
Reçu le 2 juillet 2013
Accepté le 5 décembre 2016
Disponible sur Internet le xxx

Mots clés :
Adult self-report (ASR)
Auto-évaluation
Extériorisation
Intériorisation
Psychopathologie
Structure factorielle
Validité

RÉSUMÉ

En raison de la fréquence des comorbidités, les cliniciens ont besoin d'avoir une vue d'ensemble des troubles de leurs patients, mais les entretiens structurés permettant d'en faire l'inventaire sont chronophages et parfois fastidieux. Il serait donc utile de disposer d'un questionnaire d'auto-évaluation validé permettant l'inventaire complet de la plupart des manifestations des troubles psychopathologiques les plus courants. L'objectif de ce travail est de vérifier la structure factorielle et certaines qualités psychométriques de la traduction française de l'inventaire d'auto-description pour adultes (*adult self-report* [ASR]) d'Achenbach et Rescorla (2003) qui évalue 120 problèmes émotionnels et comportementaux. Dans ce but, nous avons demandé à des étudiants d'une université à dominante littéraire et juridique de remplir l'ASR. Nous avons recueilli 905 protocoles valides remplis par des étudiants des deux sexes (699 femmes) et de différentes disciplines (669 étudiants en psychologie), dont 862 âgés de 18 à 35 ans. Les analyses factorielles confirmatoires ont permis de retrouver la structure

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : jmpetot@gmail.com (J.M. Petot).

factorielle en huit échelles syndromiques de l'instrument original (RMSEA = 0,037 ; CFI = 0,931). La cohérence interne de la plupart des échelles est comparable à celle de la version originale et la fidélité test-retest à cinq semaines est satisfaisante. Les scores des sujets français, surtout ceux des hommes, sont légèrement supérieurs à ceux des sujets américains âgés de 18 à 35 ans. Dans l'échantillon français, les scores des hommes ne diffèrent de ceux des femmes qu'à l'échelle de comportement transgressif, mais les étudiants en psychologie, quel que soit leur sexe, ont des scores d'intériorisation et de troubles de l'attention supérieurs à ceux des autres étudiants. Malgré certaines limitations, dont la principale est que les participants sont tous étudiants d'une même université, ces résultats sont de nature à encourager l'utilisation de l'ASR dans la pratique comme dans la recherche clinique.

© 2016 Société Française de Psychologie. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

A B S T R A C T

Keywords:
Adult self-report (ASR)
Externalizing
Factor structure
Internalizing
Psychopathology
Self-report inventories
Validity

Because of the frequent comorbidities, clinicians need to get a comprehensive picture of the behavioral and emotional problems presented by their patients, but structured interviews allowing for such a survey are time consuming and sometimes tedious, and no French language self-report questionnaire is currently available. The aim of the present study was to verify the factorial structure and some psychometric properties of the French version of the Achenbach and Rescorla's (2003) adult self-report (ASR), which is designed to assess 120 behavioral and emotional problems. We collected ASR forms completed by 905 students enrolled in a university having schools of humanities, social sciences, sports, laws and economics (699 women, 669 students in psychology, 862 aged 18–35 years). The confirmatory factor analyses yielded the expected eight-factor structure (RMSEA = .037; CFI = .931). The internal consistency was similar to the original, and the test-retest reliability was satisfactory. French subjects, especially men, scored higher than their American counterparts on several scales, but the effect sizes were small to medium. French women and men's scores differed only on the Rule-Breaking Behavior scale, with men scoring higher; however, students in psychology, whichever was their gender, scored higher than other students on scales measuring internalizing problems and attention problems. Despite some limitations, the main of which is that all participants were students from the same university, these results speak in favor of the use of the French adult self-report in both research and clinical practice.

© 2016 Société Française de Psychologie. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction

La prise de conscience croissante de la fréquence et de l'ampleur de la comorbidité entre les troubles psychiatriques conduit les praticiens à s'intéresser, au-delà du motif de consultation et de la demande explicite de leurs patients, à l'ensemble du tableau clinique présenté par ceux-ci. Parallèlement, les chercheurs ne peuvent plus ignorer, quand ils étudient la prévalence d'un trouble, les facteurs de risque ou les conséquences de ce trouble, que les patients qu'ils étudient présentent très probablement, à

Pour citer cet article : Mahr, S., et al. Structure factorielle et qualités psychométriques de la version française du questionnaire d'auto-description pour adultes (*adult self-report*) d'Achenbach et Rescorla. *Psychol. fr.* (2016), <http://dx.doi.org/10.1016/j.psfr.2016.12.001>

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/6817380>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/6817380>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)