



Revista Internacional de
Andrología

www.elsevier.es/andrologia



ORIGINAL

Uso del preservativo, número de parejas y debut sexual en jóvenes en coito vaginal, sexo oral y sexo anal

Andrea Blanc Molina* y Antonio J. Rojas Tejada

Departamento de Psicología, Grupo de Investigación Estudios Psicosociales y Metodológicos, Universidad de Almería, Almería, España

Recibido el 23 de noviembre de 2016; aceptado el 24 de febrero de 2017

PALABRAS CLAVE

Comportamientos sexuales;
Infecciones de transmisión sexual;
Preservativo;
Parejas sexuales;
Debut sexual

Resumen

Objetivo: El objetivo del estudio es analizar en jóvenes el uso del preservativo, el número de parejas sexuales y la edad de debut sexual en coito vaginal, sexo oral y sexo anal, y comparar entre hombres y mujeres (primera parte del estudio), así como analizar si existen diferencias según el comportamiento sexual realizado en las tres variables (segunda parte del estudio).

Material y método: Estudio *ex post-facto* descriptivo mediante encuesta online. Un total de 886 jóvenes heterosexuales (485 mujeres y 401 hombres) participaron para la primera parte del estudio. Para la segunda parte del estudio se seleccionó a los jóvenes que habían realizado los tres comportamientos sexuales objeto de estudio. Se utilizaron las dependencias de dos universidades españolas para difundir la encuesta por internet.

Resultados: Las mujeres manifestaron utilizar con más frecuencia el preservativo durante el sexo oral y los hombres declararon tener mayor número de parejas sexuales con las que realizan el coito vaginal (4,57 vs. 3,80) y el sexo oral (3,34 vs. 2,65). La edad media de inicio para el coito vaginal y el sexo oral estuvo en torno a los 17 años y para el sexo anal en torno a los 19 años. La frecuencia de uso del preservativo y el número de parejas sexuales fueron mayores en el coito vaginal y la edad de debut sexual fue mayor en el sexo anal (hombres = 19,20; mujeres = 19,38).

Conclusiones: Los resultados apoyan la idea de que los jóvenes utilizan el preservativo más para evitar embarazos que para prevenir ITS. También, que los comportamientos sexuales siguen un patrón de progresión en jóvenes heterosexuales (del coito vaginal al sexo anal).

© 2017 Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: abm769@ual.es (A. Blanc Molina).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.androl.2017.02.009>

1698-031X/© 2017 Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Cómo citar este artículo: Blanc Molina A, Rojas Tejada AJ. Uso del preservativo, número de parejas y debut sexual en jóvenes en coito vaginal, sexo oral y sexo anal. Rev Int Androl. 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.androl.2017.02.009>

KEYWORDS

Sexual behaviors;
Sexually transmitted
disease;
Condom;
Sexual partners;
Sexual debut

Condom use, number of partners and sexual debut in young people in penile-vaginal intercourse, oral sex and anal sex

Abstract

Objective: The aim of this study is to analyse condom use, number of sexual partners and age of sexual debut in young people in penile-vaginal intercourse, oral sex and anal sex, to establish a comparison between men and women (first part of the study), and to analyse the differences according to sexual behavior conducted in the three variables (second part of the study).

Material and method: Ex post facto descriptive study by online survey. A total of 886 young heterosexual people (485 women and 401 men) participated for the first part of the study. For the second part of the study, youngsters who had carried out the three sexual behaviors under study were selected. The premises of two Spanish universities were used to distribute the survey by internet.

Results: Women reported a more frequent use condom during oral sex, and men reported to have more sexual partners with whom they perform penile-vaginal intercourse (4.57 vs. 3.80) and oral sex (3.34 vs. 2.65). The average onset age for penile-vaginal intercourse and oral sex was close to 17 years and for anal sex close to 19 years. Frequency of condom use and number of sexual partners were higher in penile-vaginal intercourse and the age of sexual debut was higher in anal sex (men = 19.20; women = 19.38).

Conclusions: The results support the idea that young people use the condom more to prevent pregnancies than to prevent STD. Moreover, the sexual behaviors follow a pattern of progression in heterosexual young people (from penile-vaginal intercourse to anal sex).

© 2017 Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

Los comportamientos sexuales de riesgo (CSR) han sido objeto de estudio debido al aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y a los embarazos no deseados¹. Aunque no existe una única definición de CSR, en el ámbito de la salud existe acuerdo en considerar que son todos aquellos comportamientos sexuales que aumentan la posibilidad de un resultado negativo, como las ITS². Entre los principales CSR estarían las relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas sexuales³. El uso del preservativo, el número de parejas sexuales y la edad de debut sexual han sido variables muy analizadas en las investigaciones sobre CSR^{4,5}.

Respecto a las relaciones sexuales sin protección, se ha encontrado que alrededor del 50% de los jóvenes sexualmente activos usan siempre preservativo durante el coito vaginal^{6,7}, siendo más frecuente en las relaciones ocasionales que en las relaciones estables⁸⁻¹⁰. Aunque muchos estudios se han centrado en el uso del preservativo en el coito vaginal^{9,11-13}, la realización del sexo oral y el sexo anal sin protección también son CSR, ya que pueden causar ITS^{14,15}. En un estudio se encontró en universitarios que el porcentaje que usó preservativo en la última relación fue del 53,5% durante el coito vaginal, del 27,7% durante el sexo anal y del 4,0% durante el sexo oral⁶. Prinstein et al.¹⁶ hallaron que mientras que el 60,9% de los adolescentes utilizaban siempre preservativo durante el coito vaginal, ese porcentaje disminuía al 17,4% cuando se trataba del sexo oral. En España han sido escasos los estudios que han diferenciado entre el coito vaginal, el sexo anal y el sexo oral en el uso del

preservativo. Castro y Santos-Iglesias⁴ hallaron en jóvenes que el 54,3% había utilizado de forma consistente el preservativo durante el coito vaginal y el 39,5% durante el sexo anal. Failde et al.⁸ encontraron que el porcentaje de hombres y mujeres jóvenes que utilizaban siempre preservativo durante el coito vaginal fue del 54,5 y del 52,7%, durante el sexo anal del 33,3 y del 28,0%, y durante el sexo oral del 12,5 y del 7,6%, respectivamente.

Respecto al número de parejas sexuales, mientras que algunas investigaciones se han centrado en el número de parejas sexuales a lo largo de toda la vida^{8,13,17}, otras lo han hecho en las habidas en los últimos meses^{18,19}. Burris et al.¹³ encontraron en jóvenes entre 17 y 29 años que la media de parejas sexuales (incluido coito vaginal y sexo oral, sin diferenciar) fue de 3,7 en mujeres y de 4,2 en hombres. En España, en jóvenes heterosexuales entre 18 y 26 años se ha encontrado que la media de parejas sexuales para el coito vaginal fue de 3,8 para las mujeres y de 4,8 para los hombres, y para el sexo anal, de 1,4 y 1,6, respectivamente⁴. La mayoría de estudios sobre el número de parejas sexuales se han caracterizado por no diferenciar el número de parejas sexuales en coito vaginal, sexo oral y sexo anal.

También la variable debut sexual, que hace referencia al inicio de las relaciones sexuales, ha sido analizada en múltiples investigaciones sobre CSR. En la literatura esta variable se ha asociado con comportamientos sexuales realizados posteriormente, algunos de ellos relacionados con el uso del preservativo y el número de parejas sexuales⁵. En España, un debut sexual temprano se relacionó con mayor número de parejas sexuales y menor consistencia en el uso del preservativo²⁰. Gran parte de los estudios

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/7271323>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/7271323>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)