



Enfermería *Intensiva*

www.elsevier.es/ei



ORIGINAL

Intensidad de colaboración interprofesional entre enfermeras de cuidados intensivos de un hospital de tercer nivel

G. Serrano-Gemes (RN)* y M. Rich-Ruiz (PhD, RN)

Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina y Enfermería, Universidad de Córdoba, Córdoba, España

Recibido el 30 de junio de 2016; aceptado el 23 de octubre de 2016

PALABRAS CLAVE

Colaboración interprofesional;
Enfermería;
Cuidados críticos

Resumen

Objetivos: Medir la intensidad de colaboración interprofesional (ICP) en enfermeras de una unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de tercer nivel; comprobar diferencias entre las dimensiones de la escala Intensidad de la Colaboración Interprofesional (ICP), e identificar la influencia de variables personales en la ICP.

Método: Estudio descriptivo transversal realizado con 63 enfermeras de cuidados intensivos seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple. Variables explicativas: edad, sexo, años de experiencia en enfermería, años de experiencia en cuidados críticos, jornada laboral y turno de trabajo; variable resultado: ICP. La ICP se midió mediante el cuestionario «Intensidad de la Colaboración Interprofesional». Se realizó análisis estadístico descriptivo y bivariante (ICP y sus dimensiones con variables explicativas).

Resultados: El 73,8% fueron mujeres, con una edad media de 46,54 ($\pm 6,076$) años. La media de años de experiencia en enfermería y en cuidados críticos fue de 23,03 ($\pm 6,24$) y de 14,25 ($\pm 8,532$), respectivamente. El 77% tenían una jornada completa y el 95,1%, turno rotatorio. El 62,3% tuvieron valores de ICP media. Se encontró asociación estadísticamente significativa ($p < 0,05$) entre ICP (puntuación global) y apreciación global con años de experiencia en cuidados críticos.

Conclusiones: El estudio muestra niveles medios de ICP; las enfermeras con menos experiencia en cuidados críticos son las que puntúan más alto la ICP global y su dimensión de apreciación global.

© 2016 Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: gemaserranogemes@hotmail.com (G. Serrano-Gemes).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.enfi.2016.10.007>

1130-2399/© 2016 Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Interprofessional
collaboration;
Nursing;
Critical care

Intensity of interprofessional collaboration among intensive care nurses at a tertiary hospital

Abstract

Objectives: To measure the intensity of interprofessional collaboration (IPC) in nurses of an intensive care unit (ICU) at a tertiary hospital, to check differences between the dimensions of the Intensity of Interprofessional Collaboration Questionnaire, and to identify the influence of personal variables.

Method: A cross-sectional descriptive study was conducted with 63 intensive care nurses selected by simple random sampling. Explanatory variables: age, sex, years of experience in nursing, years of experience in critical care, workday type and work shift type; variable of outcome: IPC. The IPC was measured by: Intensity of Interprofessional Collaboration Questionnaire. Descriptive and bivariate statistical analysis (IPC and its dimensions with explanatory variables).

Results: 73.8% were women, with a mean age of 46.54 (± 6.076) years. The average years experience in nursing and critical care was 23.03 (± 6.24) and 14.25 (± 8.532), respectively. 77% had a full time and 95.1% had a rotating shift. 62.3% obtained average IPC values. Statistically significant differences were found ($P < .05$) between IPC (overall score) and overall assessment with years of experience in critical care.

Conclusions: This study shows average levels of IPC; the nurses with less experience in critical care obtained higher IPC and overall assessment scores.

© 2016 Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEIUC). Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

¿Qué se conoce/qué aporta?

En los últimos años los pacientes presentan necesidades de gran complejidad, lo que conlleva que ningún profesional pueda satisfacerlas por sí solo. Por ello, la colaboración interprofesional se ha convertido en una herramienta imprescindible para los sistemas sanitarios actuales.

Este estudio revela niveles medios de intensidad de colaboración interprofesional entre enfermeras de una unidad de cuidados intensivos, detectando posibles debilidades y, por tanto, mejoras en la colaboración interprofesional.

Implicaciones del estudio

Este estudio ha permitido detectar los componentes relacionados con la colaboración interprofesional que necesitan una mayor atención por parte de los profesionales sanitarios para conseguir una mejora en el trabajo colaborativo. Mejorar estos niveles de colaboración podría mejorar los resultados en salud de los pacientes, el trabajo en equipo de los profesionales y, en definitiva, el sistema sanitario en su conjunto. Es esencial seguir investigando sobre este tema, ya que la literatura muestra resultados positivos relacionados con la colaboración interprofesional en el medio sanitario.

Introducción

En la actualidad, las necesidades de salud de los pacientes se han vuelto tan complejas¹ que ningún profesional las puede satisfacer todas², convirtiendo el trabajo colaborativo en una meta inaplazable para los sistemas sanitarios.

Pero más allá de su carácter necesario, la colaboración interprofesional ha demostrado ser una herramienta fundamental para lograr una atención de salud eficaz y eficiente¹, pues permite mejorar los resultados en salud y fortalecer el sistema sanitario³, a la vez que fomenta la coordinación planificada de la atención⁴ y ayuda a los profesionales a desarrollar su trabajo y a abordar los problemas de forma más positiva³. Muchos *policymakers* la han señalado como una de las formas más efectivas de enfrentarse a la complejidad de la atención a la salud³.

No obstante, trabajar de forma colaborativa no es fácil¹. Existen importantes barreras que dificultan la colaboración entre profesionales: problemas de comunicación entre profesionales⁵⁻¹², el desconocimiento de las funciones y responsabilidades profesionales del otro^{5-7,12-14}, el poder y la jerarquía^{5,6,13-16}, la falta de confianza (en el otro)^{5,6} e incluso la falta de respeto^{5,6,8}. Para superar estas barreras es especialmente importante la implantación real de reuniones interprofesionales^{2,5,10,17,18}, pues la ausencia, real o de facto, de algunos colectivos en estas reuniones (en las que se decide la atención al paciente) es todavía frecuente^{6,7,15}. Pero, además, no solo basta con la existencia de este tipo de reuniones. Es necesario que los reunidos valoren las aportaciones que cada profesional hace a la salud del paciente⁹, y que no sea una mera superposición de profesionales unidos en un mismo medio sin apenas interacción entre ellos³.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/8556590>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/8556590>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)