



Relato de Caso

Cisto ósseo aneurismático do retropé: relato de dois casos[☆]

Alexandre Luiz Dal Bosco^{a,*}, Marcos Ceita Nunes^a, Jung Ho Kim^a,
Luis Gustavo Calieron^a e Rubens Rosso Nadal^{a,b}

^a Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Passo Fundo, RS, Brasil

^b Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Passo Fundo, RS, Brasil

INFORMAÇÕES SOBRE O ARTIGO

Histórico do artigo:

Recebido em 9 de novembro de 2016

Aceito em 6 de março de 2017

On-line em xxx

Palavras-chave:

Aneurisma

Cistos ósseos

Doenças do pé

Neoplasias ósseas

Keywords:

Aneurysm

Bone cysts

Foot diseases

Bone neoplasms

R E S U M O

Os tumores do retropé são raros na literatura, o diagnóstico é difícil e muitas vezes é feito pelo profissional menos experiente. Acrescente-se a isso o fato de o tratamento cirúrgico e a reconstrução serem complicados pela intrincada anatomia local. Essas lesões são desafiadoras para o ortopedista oncológico. Relatamos dois casos de cisto ósseo aneurismático do retropé e nossas opções e particularidades na condução deles de acordo com os princípios oncológicos. Nas lesões tumorais do retropé é importante a suspeita diagnóstica precoce, bem como o estadiamento adequado e a condução do caso de acordo com os princípios oncológicos, preferencialmente pelo ortopedista oncológico.

© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob a licença de CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Hindfoot aneurysmal bone cyst: report of two cases

A B S T R A C T

Osseous tumors of the hindfoot are not usual in literature, the diagnosis in these cases are difficult and can often go unnoticed. Besides that, surgery and reconstruction are complicated due to the complexity of the local anatomy, which makes these injuries even more challenging for the oncological orthopedic professionals. On the following article two cases of aneurysmal bone cyst of the hindfoot are reported, as well as the alternatives and peculiarities in conducting these cases according to the oncological principles. When the subject are hindfoot tumor injuries, the early diagnosis is extremely important, as well as the proper staging and the management of the case by the oncologic orthopedic professional according to oncological principles.

© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

[☆] Trabalho desenvolvido no Serviço de Ortopedia Pediátrica e Cirurgia Oncológica do Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Passo Fundo, Passo Fundo, RG, Brasil.

* Autor para correspondência.

E-mail: alexandredb1@yahoo.com.br (A.L. Dal Bosco).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rbo.2017.03.011>

0102-3616/© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob a licença de CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Como citar este artigo: Dal Bosco AL, et al. Cisto ósseo aneurismático do retropé: relato de dois casos. Rev Bras Ortop. 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rbo.2017.03.011>

Introdução

Os tumores do retropé são descritos raramente na literatura, normalmente o diagnóstico é difícil pelo médico generalista, com frequência a única queixa conhecida é a dor e relacionada a eventos traumáticos, o que exige alto índice de suspeição para o diagnóstico.

O cisto ósseo aneurismático é um tumor benigno, localmente agressivo, ocorre de forma primária nas duas primeiras décadas de vida, representa 1 a 2% dos tumores primários do osso e se não for tratado adequadamente tem risco de

recorrência local e posterior destruição articular e prejuízo funcional importante. Devido à complexidade de tais tumores, o manejo correto e o seguimento devem ser feitos pelo ortopedista oncológico.

Relatamos dois casos de cisto ósseo aneurismático de apresentação no retropé e nossa condução deles.

Relato de caso 1

Paciente do sexo feminino, 18 anos, apresentava dor em tornozelo direito, radiografia com lesão lítica no corpo do



Figura 1 – Radiografia do tornozelo direito, lesão de aspecto lítico no tálus.



Figura 2 – Ressonância magnética, com hiperssinal da lesão na fase T2.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/8598635>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/8598635>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)