PIEL

FORMACION CONTINUADA EN DERMATOLOGIA

www.elsevier.es/piel

Signos guía/diagnóstico diferencial

Lesiones purpúricas en la infancia

Purpura in childhood

Minia Campos-Domínguez^{a,*}, Ana Martín-Santiago^b, Ángela Hernández-Martín^c
y Ricardo Suárez-Fernández^a

^aServicio de Dermatología, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

^bServicio de Dermatología, Hospital Universitario Son Espases, Palma, Islas Baleares, España

^cServicio de Dermatología, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España

Introducción

La púrpura se define como el cambio de coloración de piel o mucosas debido a la extravasación de sangre hacia las mismas¹. El color de la púrpura es rojo, azul o morado, aunque posteriormente pueden aparecer matices verdosos, parduzcos o amarillentos. En la exploración no blanquea a la presión, por la pérdida de sangre desde los vasos hacia la dermis. Si hay un componente inflamatorio asociado, puede haber un blanqueamiento parcial. La púrpura palpable se debe al edema y la inflamación que pueden acompañar a las lesiones purpúricas. El diagnóstico diferencial se realiza con el eritema, que blanquea a la presión, y las telangiectasias, que también blanquean y además tienen una morfología característica (lineal o estrellada).

Según su tamaño, las lesiones purpúricas se dividen en petequias (<2 mm), púrpura (2-10 mm) y equimosis (>10 mm)². Esta clasificación puede ser de ayuda en el diagnóstico diferencial. En general, los trastornos plaquetarios se manifiestan como petequias, los trastornos de la coagulación como equimosis y las vasculitis como púrpura palpable. Las lesiones elementales asociadas a púrpura pueden ser máculas, pápulas o más raramente nódulos. Pueden asociar lesiones elementales secundarias como vesículas, ampollas, pústulas o costras y evolucionar en algunos casos a úlceras y cicatrices.

La existencia de púrpura implica un fallo de alguno de los elementos implicados en la integridad de los vasos sanguíneos³. Por tanto, la clasificación etiopatogénica de la púrpura se puede dividir en trastornos de las plaquetas, de los factores de coagulación o de los vasos sanguíneos. En algunos casos se alteran simultáneamente las plaquetas y los factores de coagulación. La clasificación etiopatogénica de la púrpura se recoge en la [tabla 1](#) y las entidades más frecuentes o relevantes se describen a continuación.

Causas de la púrpura en la infancia

Púrpuras causadas por alteraciones plaquetarias

Normalmente son valoradas por hematólogos⁴ y rara vez se realiza consulta a Dermatología. El cuadro más frecuente es la púrpura trombocitopénica idiopática que se desarrolla a continuación.

Púrpura trombocitopénica idiopática

Es la causa más frecuente de trombocitopenia adquirida en la infancia⁵. La forma aguda es típica de niños de 1 a 5 años, muchas veces después de un episodio de infección respiratoria. Existe también una forma crónica más típica de adolescentes del sexo femenino y menos frecuente. Su patogenia es autoinmune, por aparición de anticuerpos IgG

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: minia.campos@salud.madrid.org (M. Campos-Domínguez).

<https://doi.org/10.1016/j.piel.2017.07.012>

0213-9251/© 2017 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Tabla 1 – Clasificación etiopatogénica de la púrpura. Las entidades destacadas en negrita se desarrollan en el texto

Clasificación de la púrpura por su mecanismo		Diagnósticos	Etiología/patogenia	
Púrpuras por alteraciones plaquetarias	Por destrucción de plaquetas	De mecanismo inmune	Púrpura trombocitopénica idiopática	Anticuerpos IgG frente a la membrana plaquetaria
			Fármacos	Penicilina, ácido valproico, quinidina, sulfamidas, cimetidina, heparina
			Virus	VIH, CMV, herpesvirus
			Lupus eritematoso sistémico	Autoanticuerpos IgG e IgM
			Posttransfusional	Sensibilización generada por transfusiones previas
			Trombocitopenia neonatal aloinmune	Paso trasplacentario de anticuerpos maternos frente a antígenos plaquetarios del feto
	De mecanismo no inmune	Trombocitopenia neonatal autoinmune	Paso trasplacentario de anticuerpos por enfermedad autoinmune materna (PTI, LES) o consumo de fármacos	
		Síndrome hemolítico-urémico	Daño endotelial por toxinas (verocitotoxina producida por <i>E. coli</i> O157:H7) con destrucción de plaquetas en la microvasculatura renal	
		Púrpura trombótica trombocitopénica	Causa genética (mutación ADAMTS13)	
		Fármacos		
		Radioterapia		
		Herencia autosómica recesiva		
Por disminución de la producción de plaquetas	Causas genéticas	Síndrome	Deleción 1q21.1	
		Anemia de Fanconi	Herencia autosómica recesiva 15 genes FANC	
		Síndrome de Wiskott-Aldrich	Herencia recesiva ligada a X Gen WAS	
		Trombocitopenia amegacariocítica congénita	Herencia autosómica recesiva Gen MPL	
		Sinóstosis radiocubital con trombocitopenia amegacariocítica	Herencia autosómica dominante Tipo 1: gen HOXA11 Tipo 2: gen MECOM	
		Fármacos	Alquilantes, antimetabolitos, antiepilépticos, clorotiazidas, estrógenos	
	Causas adquiridas	Infecciones	Virus grupo TORCH Sepsis bacteriana	
		Infiltración medular	Leucemia, histiocitosis, enfermedades de depósito, trastornos granulomatosos, neuroblastoma, mielofibrosis, osteopetrosis	
		Esplenomegalia	Atrapamiento de plaquetas en el bazo	
		Trombastenia de Glanzmann	Déficit de glucoproteínas II/IIIa Herencia autosómica recesiva Genes ITGA2B/ITGB3	
		Enfermedad de Bernard-Soulier	Déficit de glucoproteína Ib Herencia autosómica recesiva Genes GP1BA/GP1BB/GP9	
		Enfermedades del pool de almacenamiento plaquetario	Diferentes defectos de los gránulos plaquetarios	
Por secuestro plaquetario Por disfunción de plaquetas	Causas genéticas	Fármacos	Aspirina, furosemda, nitrofurantoína, heparina, clofibrato, AINE	
		Uremia	Disfunción plaquetaria por acumulación de toxinas	
		Hepatopatía	Acumulación de productos de degradación del fibrinógeno	

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/8716827>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/8716827>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)