



REVISTA DE  
GASTROENTEROLOGÍA  
DE MÉXICO

[www.elsevier.es/rgmx](http://www.elsevier.es/rgmx)



ARTÍCULO DE REVISIÓN

## Consenso mexicano sobre la dispepsia

R. Carmona-Sánchez<sup>a,\*</sup>, O. Gómez-Escudero<sup>b</sup>, M. Zavala-Solares<sup>c</sup>,  
M.V. Bielsa-Fernández<sup>d</sup>, E. Coss-Adame<sup>e</sup>, A.I. Hernández-Guerrero<sup>f</sup>, F. Huerta-Iga<sup>g</sup>,  
M.E. Icaza-Chávez<sup>h</sup>, M.A. Lira-Pedrín<sup>i</sup>, J.A. Lizárraga-López<sup>j</sup>, A. López-Colombo<sup>k</sup>,  
A. Noble-Lugo<sup>l</sup>, J. Pérez-Manauta<sup>m</sup>, R.H. Raña-Garibay<sup>l</sup>, J.M. Remes-Troche<sup>n</sup>,  
J.L. Tamayo<sup>o</sup>, L.F. Uscanga<sup>p</sup>, F. Zamarripa-Dorsey<sup>q</sup>, M.A. Valdovinos Díaz<sup>e</sup>  
y J.A. Velarde-Ruiz Velasco<sup>r</sup>

<sup>a</sup> Práctica privada, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

<sup>b</sup> Clínica de Gastroenterología, Endoscopia Digestiva y Motilidad Gastrointestinal, Hospital Ángeles Puebla, Puebla, Puebla, México

<sup>c</sup> Unidad de Motilidad Gastrointestinal, Hospital General de México, Ciudad de México, México

<sup>d</sup> Unidad de Pacientes en Estudio, Universidad Autónoma de Guadalajara, Zapopán, Jalisco, México

<sup>e</sup> Departamento de Gastroenterología y Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de México, México

<sup>f</sup> Departamento de Endoscopia, Instituto Nacional de Cancerología, Ciudad de México, México

<sup>g</sup> Servicio de Endoscopia y Fisiología Digestiva, Hospital Ángeles Torreón, Torreón, Coahuila, México

<sup>h</sup> Hospital Star Médica de Mérida, Mérida, Yucatán, México

<sup>i</sup> Hospital Ángeles Tijuana, Tijuana, Baja California Norte, México

<sup>j</sup> Servicio de Endoscopia, Unidad Médica de Atención Ambulatoria 265, Instituto Mexicano del Seguro Social, Culiacán, Sinaloa, México

<sup>k</sup> Dirección de Educación e Investigación en Salud, UMAE Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, IMSS, Puebla, Puebla, México

<sup>l</sup> Servicio de Gastroenterología, Hospital Español de México, Ciudad de México, México

<sup>m</sup> Departamento de Enseñanza e Investigación, Hospital Español de México, Ciudad de México, México

<sup>n</sup> Departamento de Gastroenterología, Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana, Veracruz, Veracruz, México

<sup>o</sup> Servicio de Gastroenterología y Endoscopia Gastrointestinal, Hospital Civil de Culiacán, Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México

<sup>p</sup> Departamento de Gastroenterología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de México, México

<sup>q</sup> Departamento de Gastroenterología, Hospital Juárez, Ciudad de México, México

<sup>r</sup> Departamento de Gastroenterología, Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, Guadalajara, Jalisco, México

Recibido el 9 de diciembre de 2016; aceptado el 31 de enero de 2017

\* Autor para correspondencia. Mariano Arista 931-5, Col. Tequisquiapan, 78250 San Luis Potosí, México.  
Teléfono: +524448292790/+5214448338945.

Correo electrónico: [rcarmonas1@prodigy.net.mx](mailto:rcarmonas1@prodigy.net.mx) (R. Carmona-Sánchez).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rgmx.2017.01.001>

0375-0906/© 2017 Asociación Mexicana de Gastroenterología. Publicado por Masson Doyma México S.A. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

**PALABRAS CLAVE**  
Dispepsia;  
Dispepsia funcional;  
Consenso;  
Diagnóstico;  
Tratamiento

**Resumen** Desde la publicación de las guías de dispepsia 2007 de la Asociación Mexicana de Gastroenterología ha habido avances significativos en el conocimiento de esta enfermedad. Se realizó una revisión sistemática de la literatura en PubMed (01/2007 a 06/2016) con el fin de revisar y actualizar las guías 2007 y proporcionar nuevas recomendaciones basadas en evidencia. Se incluyeron todas las publicaciones en español e inglés, de alta calidad. Se redactaron enunciados que fueron votados utilizando el método Delphi. Se estableció la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones según el sistema GRADE para cada enunciado. Treinta y un enunciados fueron redactados, votados y calificados. Se informan nuevos datos sobre definición, clasificación, epidemiología y fisiopatología. La endoscopia debe realizarse en dispepsia no investigada cuando hay datos de alarma o falla al tratamiento. Las biopsias gástricas y duodenales permiten confirmar infección por *Helicobacter pylori* y excluir enfermedad celiaca, respectivamente. Establecer una fuerte relación médico-paciente, cambios en la dieta y en el estilo de vida son útiles como medidas iniciales. Los bloqueadores H<sub>2</sub>, inhibidores de la bomba de protones, prokinéticos y fármacos antidepresivos son efectivos. La erradicación de *H. pylori* puede ser eficaz en algunos pacientes. Con excepción de Iberogast y rikkunshito, las terapias complementarias y alternativas carecen de beneficio. No existe evidencia con respecto a la utilidad de prebióticos, probióticos o terapias psicológicas. Los nuevos enunciados proporcionan directrices basadas en la evidencia actualizada. Se presenta la discusión, el grado y la fuerza de la recomendación de cada uno de ellos.

© 2017 Asociación Mexicana de Gastroenterología. Publicado por Masson Doyma México S.A. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

**KEYWORDS**

Dyspepsia;  
Functional dyspepsia;  
Consensus;  
Diagnosis;  
Treatment

**Mexican consensus on dyspepsia**

**Abstract** Since the publication of the 2007 dyspepsia guidelines of the *Asociación Mexicana de Gastroenterología*, there have been significant advances in the knowledge of this disease. A systematic search of the literature in PubMed (01/2007 to 06/2016) was carried out to review and update the 2007 guidelines and to provide new evidence-based recommendations. All high-quality articles in Spanish and English were included. Statements were formulated and voted upon using the Delphi method. The level of evidence and strength of recommendation of each statement were established according to the GRADE system. Thirty-one statements were formulated, voted upon, and graded. New definition, classification, epidemiology, and pathophysiology data were provided and include the following information: Endoscopy should be carried out in cases of uninvestigated dyspepsia when there are alarm symptoms or no response to treatment. Gastric and duodenal biopsies can confirm *Helicobacter pylori* infection and rule out celiac disease, respectively. Establishing a strong doctor-patient relationship, as well as dietary and lifestyle changes, are useful initial measures. H<sub>2</sub>-blockers, proton-pump inhibitors, prokinetics, and antidepressants are effective pharmacologic therapies. *H. pylori* eradication may be effective in a subgroup of patients. There is no evidence that complementary and alternative therapies are beneficial, with the exception of Iberogast and rikkunshito, nor is there evidence on the usefulness of prebiotics, probiotics, or psychologic therapies. The new consensus statements on dyspepsia provide guidelines based on up-to-date evidence. A discussion, level of evidence, and strength of recommendation are presented for each statement.

© 2017 Asociación Mexicana de Gastroenterología. Published by Masson Doyma México S.A. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

## Introducción

La dispepsia es un complejo síntoma que se presenta con elevada frecuencia en la población general<sup>1</sup>. Se define como la presencia de malestares crónicos y recurrentes en el epigastrio, entre los que se incluyen una amplia variedad de síntomas como dolor, ardor, distensión, saciedad temprana, plenitud, eructos, náusea o vómito que pueden ser continuos o intermitentes<sup>2</sup>. Este síndrome puede

ser la manifestación de diversas enfermedades orgánicas, sistémicas o metabólicas (dispepsia orgánica o secundaria) o no tener una causa evidente (dispepsia funcional). Así, la dispepsia abarca un grupo heterogéneo de enfermos cuyas manifestaciones clínicas son comunes pero causadas por mecanismos fisiopatológicos diferentes, por lo que pueden requerir un tratamiento diferenciado. Este padecimiento representa un reto para el médico debido a la frecuente sobreposición con otros síndromes digestivos, la

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/8730891>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/8730891>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)