




Revista de Psiquiatría y Salud Mental

www.elsevier.es/saludmental



ORIGINAL

Ideación suicida en una muestra representativa de adolescentes españoles

Eduardo Fonseca-Pedrero^{a,b,*}, Félix Inchausti^c, Laura Pérez-Gutiérrez^a,
Rebeca Aritio Solana^a, Javier Ortuño-Sierra^a, M.^a Ángeles Sánchez-García^d,
Beatriz Lucas-Molina^e, César Domínguez^f, David Foncea^a, Virginia Espinosa^a,
Ana Gorriá^g, Elena Urbiola-Merina^h, Marta Fernández^g,
Carmen Merina Díaz^g, Carmen Gutiérrez^g, Marta Aures^g, María S. Campos^g,
Elena Domínguez-Garridoⁱ y Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga^a

^a Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad de La Rioja, Logroño, España

^b Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), Oviedo, España

^c Centro de Salud Mental Ermitagaña, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España

^d Consejería de Educación, Gobierno de la Rioja, Logroño, España

^e Departamento de Psicología, Universidad de Valencia, Valencia, España

^f Departamento de Matemáticas y Computación, Universidad de La Rioja, Logroño, España

^g Consejería de Salud, Gobierno de La Rioja, Logroño, España

^h Servicio de Psiquiatría, Complejo Hospitalario San Juan de Dios, Madrid, España

ⁱ Fundación Rioja Salud, Logroño, España

Recibido el 13 de junio de 2017; aceptado el 26 de julio de 2017

PALABRAS CLAVE

Prevalencia;
Suicidio;
Ideación suicida;
Adolescencia;
Validación

Resumen

Introducción: El suicidio es un problema sociosanitario de primer orden. El propósito de este estudio fue analizar la ideación suicida en una muestra representativa de adolescentes españoles. Concretamente, se examinó las tasas de prevalencia, se validó la Escala Paykel de Ideación Suicida (*Paykel Suicide Scale*, PSS) y se analizó el ajuste socioemocional de aquellos adolescentes con ideación suicida.

Material y métodos: La muestra la formaron 1.664 participantes ($M = 16,12$ años; $DT = 1,36$; rango 14-19 años) seleccionados mediante muestreo estratificado por conglomerados. Los instrumentos empleados fueron la PSS, el *Strengths and Difficulties Questionnaire*, el *Personal Wellbeing Index-School Children* y la Escala Oviedo de Infrecuencia de Respuesta.

Resultados: El 4,1% de la muestra informó haber intentado quitarse la vida en el último año. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones medias de la PSS en función del género pero no en función de la edad. El modelo unidimensional de la PSS presentó excelentes índices de bondad de ajuste y se mostró invariante en función del

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: eduardo.fonseca@unirioja.es (E. Fonseca-Pedrero).

género. La fiabilidad de las puntuaciones de la PSS, estimada con el alfa ordinal, fue de 0,93. Los participantes con ideación suicida informaron de un peor estado de salud mental y menor satisfacción con la vida respecto al grupo de comparación.

Conclusiones: La ideación suicida se encuentra presente en población adolescente y se asocia a un peor bienestar emocional subjetivo y a mayores problemas emocionales y comportamentales. La PSS parece mostrar un adecuado comportamiento psicométrico para evaluar la ideación suicida en adolescentes. Estos resultados tienen claras implicaciones, tanto a nivel sanitario como educativo, de cara a mejorar la promoción del bienestar emocional y la prevención de los problemas psicológicos y psiquiátricos en este sector de la población.

© 2017 SEP y SEPB. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Prevalence;
Suicide;
Suicidal ideation;
Adolescence;
Validation

Suicidal ideation in a community-derived sample of Spanish adolescents

Abstract

Introduction: Suicide is a current public health problem and among the main causes of mortality in adolescents and young adults. The main goal of this study was to analyse suicidal ideation in a representative sample of Spanish adolescents. Specifically, the prevalence rates of suicide ideation, the psychometric properties of the Paykel Suicide Scale (PSS) scores, and the socio-emotional adjustment of adolescents at risk for suicide were analysed.

Material and methods: The sample consisted of 1,664 participants ($M = 16.12$ years, $SD = 1.36$, range 14-19 years), selected by stratified sampling by clusters. The instruments used were the PSS, the Strengths and Difficulties Questionnaire, the Personal Wellbeing Index-School Children, and the Oviedo Infrequency Scale.

Results: The results showed that 4.1% of the sample indicated that they had tried to commit suicide in the previous year. Statistically significant differences were found according to gender but not according to age in the PSS mean scores. The analysis of the internal structure of the PSS showed that the one-dimensional model presented excellent goodness of fit indexes. This model showed measurement invariance across gender. The reliability of the scores, estimated with ordinal alpha, was 0.93. Participants who reported suicide ideation showed poorer mental health status and lower life satisfaction compared to the non-suicide ideation group.

Conclusions: Suicidal ideation is present during adolescence and is associated with poor subjective well-being and increased emotional and behavioural problems. PSS seems to show adequate psychometric behaviour to assess suicidal ideation in adolescents. These findings have clear implications, both in health and education systems, to improve the promotion of emotional well-being and prevention of psychological and psychiatric problems in this sector of the population.

© 2017 SEP y SEPB. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Los trastornos mentales se encuentran entre las primeras causas de discapacidad asociada y de carga de enfermedad en el grupo de edad de 10 a 24 años¹. Dentro de este conjunto de problemas, por su impacto, gravedad y coste sociosanitario asociado, destaca el suicidio. El suicidio es una de las causas principales de años de vida perdidos por muerte prematura^{2,3}, siendo la segunda causa de muerte entre personas adolescentes y jóvenes adultos de entre 15 y 29 años⁴. La tasa mundial de suicidio en el año 2012 fue de 11,4 por 100.000 habitantes. En este año en concreto, en España, la tasa estandarizada de suicidios fue de 8,1 por cada 100.000 habitantes. En el periodo 2000-2012 fallecieron por suicidio en España 42.905 personas mayores de 15 años. La tasa media anual de incidencia durante el periodo fue de 95 suicidios/millón de habitantes. El sur y el noroeste de España acumularon las mayores tasas de mortalidad por suicidio⁵. Según el Instituto Nacional de Estadística⁶, en el año 2013, 310 niños y jóvenes menores

de 30 años se quitaron la vida, dato que supone un 7,77% del total de víctimas del suicidio. En ese mismo año, las tasas de suicidio en la población joven (edad de los 15-19 años) fueron de 2,65 por cada 100.000 habitantes⁷.

El impacto de esta problemática no se reduce únicamente a las tasas de suicidio consumado, sino también a la ideación suicida o a las tentativas de suicidio previas. La ideación suicida y las tentativas previas son precedentes frecuentes del suicidio consumado. Por ejemplo, Gabilondo et al.⁸ encontraron que la probabilidad de realizar un intento entre aquellos que presentaban ideación suicida (habían elaborado un plan suicida) fue claramente superior (73%) a la de quienes no tenían plan (14,4%). La prevalencia vital de ideación suicida en España es del 4,4-7,8%, mientras que para los intentos de suicidio es del 1,5-1,8%^{8,9}. En población adolescente, los resultados varían ligeramente respecto a los encontrados en población adulta¹⁰⁻¹⁵. Por ejemplo, en un estudio multicéntrico realizado en diferentes países europeos con

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/8816273>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/8816273>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)