ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA

www.elsevier.es/oftalmologia

Comunicación corta

Presentación atípica de la enfermedad de Best

Ó. Gutiérrez-Montero, J.A. Reche-Sainz*, M.J. Peral Ortiz de la Torre
y N. Toledano-Fernández

Servicio de Oftalmología, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 5 de diciembre de 2017

Aceptado el 20 de marzo de 2018

On-line el xxx

Palabras clave:

Enfermedad de Best

Distrofia macular viteliforme de

Best

Desprendimiento neurosensorial de

la retina

R E S U M E N

Caso clínico: Varón de 43 años atendido por agudeza visual reducida, inicialmente atribuida a ambliopía estrábica. Funduscópicamente se observaban extensos desprendimientos neurosensoriales (DNS) bilaterales en el polo posterior, delimitados por acumulación de lipofucsina. Un hijo suyo de 3 años fue también explorado y, en el fondo de ojo, presentaba DNS circunscritos con presencia de pseudohipopion en el ojo derecho y fibrosis cicatricial en el ojo izquierdo. Para ambos, el índice de Arden estaba disminuido en la electrooculografía, y el estudio genético reveló una misma mutación del gen BEST1.

Discusión: La existencia de amplios DNS bilaterales puede ser una forma inusual de presentación de la enfermedad de Best. La historia familiar, la electrooculografía y el estudio genético avalaron este diagnóstico.

© 2018 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Atypical presentation of Best Disease

A B S T R A C T

Clinical case: A 43-year-old man was treated for reduced visual acuity, initially attributed to strabismic amblyopia. On fundus examination, bilateral neurosensory detachments (NSD) were observed in posterior pole, surrounded by deposits of lipofuscin. His 3-year-old son was also examined and circumscribed NSD was observed with the presence of pseudohypopyon in OD and a fibrosis scar in OS. The Arden ratio were decreased in electrooculography (EOG) in both patients, and genetic studies revealed a single mutation of the BEST1 gene.

Discussion: The existence of extensive bilateral NSD may be an unusual form of presentation of Best disease. Family history, EOG, and genetic study supported this diagnosis.

© 2018 Sociedad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Keywords:

Best disease

Best vitelliform macular dystrophy

Neurosensory retinal detachment

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: jalbres@yahoo.es (J.A. Reche-Sainz).

<https://doi.org/10.1016/j.oftal.2018.03.006>

0365-6691/© 2018 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Introducción

La distrofia macular viteliforme de Best (DMVB), también conocida como enfermedad de Best (EB), es una maculopatía progresiva de herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta y de expresividad clínica muy variable, incluso entre familiares¹⁻³. La presentación es generalmente bilateral con inicio en la infancia¹⁻³, y se caracteriza por una típica acumulación subretiniana única, redonda u ovalada, de color amarillo-anaranjado, que se localiza en la mácula¹⁻⁴, siendo el aspecto inicial en «yema de huevo» (viteliforme); esta lesión puede evolucionar hacia la progresiva degradación del

material viteliforme y la aparición de una atrofia del epitelio pigmentario de la retina (EPR) del área afectada¹⁻⁵. Esta fase final atrófica/cicatricial puede complicarse con hemorragias subretinianas agudas, asociadas o no a neovascularización coroidea¹⁻³, y menos frecuentemente con la aparición de agujeros maculares¹. No obstante, la pérdida visual no suele ser abrupta, sino más bien lenta e insidiosa hasta las fases más avanzadas². La gran variabilidad fenotípica observada se debe principalmente a las diferentes fases evolutivas propias de esta distrofia, pero también a su heterogenicidad genética^{1,2}. Se describen un caso de EB en adulto de presentación atípica y otro caso de la misma familia que fue una importante pista diagnóstica.

Figura 1 – Caso del padre. Exploración inicial. Fondo de ojo OD (A) y OI (B): desprendimiento neurosensorial demarcado por depósitos de lipofuscina, y otros acúmulos aislados parapapilares superiores. OCT macular OD (C) OI (D): desprendimiento seroso central (asteriscos rojos), acumulación de material hiperreflectivo (lipofuscina) sobre epitelio pigmentario de la retina (EPR) (flechas azules), banda engrosada e hiperreflectiva entre EPR y línea elipsoide (flechas amarillas). Evolución. Fondo de ojo y autofluorescencia de OD (E) y de OI (F): DNS menos extensos. Hiperfluorescencia de los depósitos de lipofuscina. OCT macular OD (G) y OI (H): DNS más planos (asteriscos rojos) con acúmulo periférico de material hiperreflectivo sobre el EPR (flecha azul), aumento de la banda hiperreflectiva de fotorreceptores (flecha amarilla) y quiste intrarretiniano en OI.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/8958514>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/8958514>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)