




Medicina de Familia SEMERGEN

www.elsevier.es/semergen



ORIGINAL

Análisis de la renuncia a la vacunación antigripal (Estudio REGRIVI)

S. Méijome-Blanco, G. González-Cristobo* y A.Á. Regueiro-Martínez

Centro de Salud de Vilanova de Arousa (SERGAS), Vilanova de Arousa, Pontevedra, España

Recibido el 9 de septiembre de 2017; aceptado el 17 de diciembre de 2017

PALABRAS CLAVE

Vacunas contra la influenza;
Gripe humana;
Cobertura de vacunación

Resumen

Introducción: El objetivo del presente estudio es conocer las causas de renuncia a la vacunación antigripal en el Centro de Salud de Vilanova de Arousa y evaluar la cobertura vacunal tras una intervención educativa.

Material y métodos: Se realizó un estudio cuasiexperimental pre- y postintervención educativa incluyendo a los pacientes del Centro de Salud de Vilanova de Arousa que renunciaron a la vacunación antigripal en 2014 y que no cumplieron los criterios de exclusión establecidos (fallecimiento durante las campañas 2014 y 2015, no aceptación de participación, errores de registro de la vacuna, contraindicación o no indicación de la vacuna, imposibilidad de contacto), resultando 73 los sujetos a estudio. Tras realizar una breve intervención educativa, se contrastaron los datos de vacunación de dichos pacientes en las campañas 2015 y 2016. Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo de las variables a estudio. Finalizaron el estudio 72 de los 73 pacientes incluidos inicialmente.

Resultados: Los principales motivos para rechazar la vacunación fueron el miedo a los efectos adversos y la buena percepción de salud. Se consiguió un 50,7% de vacunación en 2015 y un 48,6% en 2016.

Conclusiones: Las causas de renuncia a la vacunación son abordables mediante una intervención breve, ya que disminuye dicha renuncia a la mitad de forma duradera.

© 2018 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: gloria.gonzalez.cristobo@sergas.es (G. González-Cristobo).

<https://doi.org/10.1016/j.semerg.2017.12.003>

1138-3593/© 2018 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Cómo citar este artículo: Méijome-Blanco S, et al. Análisis de la renuncia a la vacunación antigripal (Estudio REGRIVI). Semergen. 2018. <https://doi.org/10.1016/j.semerg.2017.12.003>

KEYWORDS

Influenza vaccines;
Human influenza;
Immunisation
coverage

Analysis of the refusal of the flu vaccination (REGRIVI study)

Abstract

Introduction: The objective of this study is to determine the reasons for refusing the flu vaccination in the Primary Care Health Centre of Vilanova de Arousa, Spain, as well as to evaluate the flu vaccination coverage after an educational intervention.

Material and methods: A quasi-experimental before and after study was conducted after an educational intervention on a total of 73 people that included those Primary Care Health Centre patients from Vilanova de Arousa who had refused the flu vaccination in 2014, and who did not meet the exclusion criteria (death during 2014 and 2015 campaigns, non-acceptance of participation, vaccine registration mistakes, contraindication or no indication for the vaccine, inability to contact). After a brief educational intervention, vaccination data from those patients in the 2015 and 2016 campaigns were checked. A descriptive analysis of the variables under study was then carried out. Of the 73 patients initially included, 72 completed the study. **Results:** The main reasons for refusing a vaccination were the concerns about the adverse effects and patient perception of good health. Vaccination coverage was 50.7% in 2015, and 48.6% in 2016.

Conclusions: The reasons for refusing vaccination are approachable with a brief intervention since the refusal decreases by half in the long-term.

© 2018 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

La gripe es una enfermedad infecciosa aguda muy contagiosa, de propagación rápida, que genera graves problemas de salud pública. Cursa en forma de brotes epidémicos de intensidad variable que incrementan las consultas, los ingresos y la morbimortalidad, implicando un importante coste económico^{1,2}.

Clásicamente, las recomendaciones de vacunación se han dirigido a las personas mayores de 64 años y a aquellas con factores de riesgo (enfermedades crónicas, pacientes inmobilizados, inmunodeprimidos, etc.)³.

La vacuna de la gripe tiene un importante beneficio, ya que reduce la frecuencia de complicaciones secundarias y disminuye el riesgo de hospitalización y muerte en los adultos de 60 o más años⁴.

La campaña antigripal realizada por la Consellería de Sanidade de Galicia durante la temporada 2014 tenía como objetivos marcados: conseguir una cobertura en la población de 60-64 años igual o superior al 35%, alcanzándose un 20,2%; y una cobertura en la población mayor de 65 igual o superior al 65%, lográndose un 52,4%^{5,6}, datos por debajo de la media de España en ese año⁷.

Consecuentemente, es pertinente realizar intervenciones sobre dicha población para tratar de aumentar la cobertura vacunal⁸. Así, se diseñó este estudio para conocer las causas de la renuncia a la vacunación antigripal en la campaña 2014 en el Centro de Salud de Vilanova de Arousa y evaluar la cobertura de vacunación para las campañas 2015 y 2016, tras haber realizado una intervención educativa sobre aquellos pacientes incluidos a estudio.

Material y métodos

El presente trabajo se trata de un estudio cuasiexperimental antes-después cuya población diana estuvo formada por todos los pacientes adscritos al Centro de Salud de Vilanova de Arousa, perteneciente a la Estructura Organizativa de Xestión Integrada Pontevedra-Salnés.

El tamaño muestral se correspondió con aquellos pacientes que cumplieron criterios de inclusión y no de exclusión. El criterio de inclusión consistió en tener registrada en la historia clínica la renuncia a la vacunación antigripal durante la campaña 2014.

Fueron criterios de exclusión: fallecimiento durante las campañas 2014 y 2015, no aceptación de participación en el estudio, errores de registro de la vacuna, contraindicación o no indicación de la vacuna, imposibilidad de contacto.

En este caso, dado que los sujetos a estudio son personas que no se han vacunado en un determinado período de tiempo, resulta imposible la aleatorización de los participantes y la existencia de un grupo control.

Los datos acerca de vacunación y renuncias fueron obtenidos del Servicio de Alertas Epidemiológicas de Pontevedra. Se estableció contacto telefónico con los pacientes a estudio, se les citó en consulta y se les entregó el documento de consentimiento informado y la hoja de información. Se registró el motivo de renuncia a la vacunación: miedo a los efectos adversos, miedo al pinchazo, percepción de buena salud, falta de información, baja frecuentación del sistema de salud, otros. Posteriormente, se realizó una intervención breve de tipo educativo, donde se les explicó a los pacientes la sintomatología característica de la gripe, su evolución habitual y las posibles complicaciones derivadas.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/8964283>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/8964283>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)