




Dostępne online www.sciencedirect.com

ScienceDirect

journal homepage: www.elsevier.com/locate/alkona



Artykuł oryginalny/Original article

Rozpoznawanie uzależnienia od alkoholu przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: polskie wyniki europejskiego projektu badawczego Alcoholism in Primary Care

General practitioners recognising alcohol dependence: results of the European Alcoholism in Primary Care (APC) study for Poland

Andrzej Jakubczyk¹, Jürgen Rehm^{2,3,4,5,6}, Jakob Manthey⁶, Antoni Gual⁷,
Marcin Wojnar^{1,8,*}

¹ Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Poland

² Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada

³ Addiction Policy, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, Canada

⁴ Faculty of Medicine, Institute of Medical Science, University of Toronto, Canada

⁵ Department of Psychiatry, University of Toronto, Canada

⁶ Institute of Clinical Psychology and Psychotherapy & Center of Clinical Epidemiology and Longitudinal Studies (CELOS), Technische Universität Dresden, Germany

⁷ Institut Clinic de Neurosciences, Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona, Spain

⁸ Addiction Research Center, Department of Psychiatry, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA

INFORMACJE O ARTYKULE

Historia artykułu:

Otrzymano: 13.05.2015

Zaakceptowano: 22.06.2015

Dostępne online: 19.09.2015

Keywords:

General practitioner

GP practice

Alcohol dependence

CIDI

Sleep problems

ABSTRACT

Introduction: Alcohol dependence is one of the most rarely recognised and treated psychiatric disorders in the Polish population. The aim of the study was to assess the prevalence of alcohol dependence (AD) as well as the characteristics of alcohol dependent patients presenting themselves to general practitioners (GPs) on an average day.

Methods: A total of 2396 patients were assessed by their GPs within an AD diagnosis. In the next step, 1197 patients from the primary group were assessed by independent interviewers using the Composite International Diagnostic Interview questionnaire (CIDI) based on the DSM-IV criteria of alcohol dependence.

* Adres do korespondencji: Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Polska. Tel.: +48 22 825 1236; fax: +48 22 825 1315.

Adres email: marcin.wojnar@wum.edu.pl (M. Wojnar).

Peer review under responsibility of Institute of Psychiatry and Neurology.

Results: General practitioners recognised AD during the last 12 months in 4.9% of their patients, whereas CIDI assessment revealed prevalence of AD at 6.3%. The overlap between these two groups was only 12.5%. Patients identified by GPs turned out to be significantly older, more frequently males and with comorbid liver disease than those diagnosed with CIDI. The compiled population of AD patients was characterised by more frequent sleep problems, liver diseases and nicotine dependence in comparison to non-alcoholic subjects.

Discussion: The prevalence of alcohol dependence among GP patients is significantly higher than in the general population.

Conclusion: General practitioners should be more sensitive to alcohol use problems in females and younger patients who are yet to develop any somatic consequences of drinking. Smoking patients and those suffering from sleep problems should be also considered at risk for alcohol dependence.

© 2015 Institute of Psychiatry and Neurology. Production and hosting by Elsevier Sp. z o.o. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

STRESZCZENIE

Słowa kluczowe:
lekarz POZ
poradnia POZ
uzależnienie od alkoholu
CIDI
zaburzenia snu

Wprowadzenie: Uzależnienie od alkoholu (UA) jest jednym z najrzadziej rozpoznawanych i leczonych zaburzeń psychicznych w polskiej populacji. Celem projektu była ocena częstości występowania uzależnienia od alkoholu wśród pacjentów zgłaszających się do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także ocena charakterystyki i odsetka pacjentów z UA identyfikowanych przez lekarzy POZ.

Metoda: 2396 pacjentów zgłaszających się do poradni POZ lekarze rodzinni ocenili pod kątem obecności objawów uzależnienia. Następnie wybrani pacjenci (1197 osób) zostali poddani ocenie ankietera, który badał obecność objawów uzależnienia za pomocą kwestionariusza CIDI (*Composite International Diagnostic Interview*) uwzględniającego kryteria uzależnienia od alkoholu zawarte w klasyfikacji DSM-IV.

Wyniki: W ocenie lekarzy POZ, 4,9% pacjentów spełniło kryteria uzależnienia od alkoholu w okresie ostatnich 12 miesięcy. W badaniu przeprowadzonym przez ankieterów odsetek ten wynosił 6,3%. W grupie osób, u których lekarze rodzinni stwierdzili objawy uzależnienia od alkoholu, jedynie u 12,5% osób potwierdzono to rozpoznanie za pomocą kwestionariusza CIDI. Pacjenci identyfikowani przez lekarzy POZ jako uzależnieni byli istotnie starsi, częściej płci męskiej i częściej występowały u nich choroby wątroby niż w grupie osób identyfikowanych przez CIDI. Połączona populacja pacjentów uzależnionych od alkoholu charakteryzowała się istotnie częstszymi zaburzeniami snu, chorobami wątroby i uzależnieniem od nikotyny niż populacja osób nieuzależnionych.

Omówienie: Uzależnienie od alkoholu występuje u pacjentów poradni POZ częściej niż w populacji ogólnej.

Wnioski: Lekarze rodzinni powinni zachować większą czujność dotyczącą zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet oraz młodszych pacjentów, u których nie występują jeszcze konsekwencje somatyczne picia. Warto również zwrócić baczną uwagę na osoby uzależnione od nikotyny oraz skarżące się na zaburzenia snu.

© 2015 Institute of Psychiatry and Neurology. Production and hosting by Elsevier Sp. z o.o. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/900775>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/900775>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)