Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

SciVerse ScienceDirect

L'évolution psychiatrique 78 (2013) 641–651

L'ÉVOLUTION PSYCHIATRIQUE

www.em-consulte.com

Article original

Le symptôme hypocondriaque dans un cas de psychose puerpérale☆

The hypochondriac symptom in a case of puerperal psychosis

Marjorie Roques[a,*], Elisa Venturini[b,c], Gérard Pirlot[d], François Pommier[e]

[a] *Psychologue clinicienne, docteur en psychologie de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense, ATER en psychologie clinique, EA-4591, laboratoire cliniques psychopathologique et interculturelle, université Toulouse-Le-Mirail, 5, allée Antonio-Machado, 31100 Toulouse, France*

[b] *Psychologue clinicienne-chercheur, laboratoire de recherche clinique du département de cancérologie, CHU de Bordeaux, 33404 Bordeaux, France*

[c] *Doctorante en psychopathologie psychanalytique, EA 4056, laboratoire de psychologie clinique et de psychopathologie, université Paris Descartes, Sorbonne Paris-Cité, institut de psychologie, 71, avenue Édouard-Vaillant, 92774 Boulogne-Billancourt, France*

[d] *Psychiatre, psychanalyste, professeur de psychopathologie psychanalytique, directeur du laboratoire cliniques psychopathologique et Interculturelle, EA 4591, université Toulouse-Le-Mirail, 5, allée Antonio-Machado, 31100 Toulouse, France*

[e] *Psychiatre, psychanalyste, professeur de psychopathologie psychanalytique, co-directeur du laboratoire de psychopathologie psychanalytique des atteintes somatiques et identitaires, EA 3460, université Paris-Ouest, Nanterre La-Défense, 200, avenue de la République, 92000 Nanterre, France*

Reçu le 25 octobre 2011

Résumé

L'hypocondrie est un symptôme transversal qui peut recouvrir n'importe quelle structure psychique. Cependant, nous savons qu'il ne suffit pas de procéder à l'élaboration d'une symptomatologie pour en déduire une organisation mentale. Dans la névrose, nous dirions que l'hypocondrie sert la relation à l'autre, tandis que dans la psychose, elle participerait à un repli autistique responsable d'une augmentation de l'angoisse. Les auteurs formulent l'hypothèse selon laquelle l'intervention de ce symptôme est une manifestation de l'angoisse de morcellement et le signe avant coureur d'une décompensation psychotique sur un mode paranoïaque. Afin d'illustrer leurs propos, ils présentent Amélie, 27 ans, rencontrée dans un service

☆ Toute référence à cet article doit porter mention : Roques M. Le symptôme hypocondriaque dans un cas de psychose puerpérale. Evol Psychiatr. année ; Vol. (n°) : pages (pour la version papier) ou adresse URL et date de consultation (pour la version électronique).

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : marjorie.roques@live.fr (M. Roques).

0014-3855/$ – see front matter © 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
http://dx.doi.org/10.1016/j.evopsy.2012.08.013

de maternité. L'étude de ce cas permet de décliner les différentes fonctions que peut revêtir l'hypocondrie : à la fois symptôme pour tenter de maintenir un lien social (mais qui échoue), mécanisme de défense pour se protéger de l'effondrement psychotique, enfin, mode particulier de fonctionnement constitutif d'un délire systématisé. Ce qui aurait pu, lors de la première rencontre avec la jeune femme, laisser penser à une hystérie de conversion (manifestations psychosomatiques, phobies, amnésie infantile), a finalement dévoilé l'existence d'un noyau mélancolique, sous-tendu par l'impossibilité d'admettre la mort du père qui a eu lieu au décours de la troisième grossesse d'Amélie. Il apparaîtrait que ce traumatisme ait joué un rôle prépondérant dans la décompensation d'une psychose puerpérale sur un versant paranoïaque et dont la structure nucléaire serait la mélancolie.
© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Psychanalyse ; Maternité ; Psychose puerpérale ; Hypocondrie ; Paranoïa ; Mélancolie ; Cas clinique

Abstract

The hypochondria is a transverse symptom, which can cover any psychic structure. However, we know that it is not enough proceeding to the elaboration of a symptomatology to deduct a mental organization from it. In the neurosis, we would say that the hypochondria is of use the relation to the other one, whereas in the psychosis, it would participate in an autistic fold responsible for an increase of the anxiety. The authors formulate the hypothesis according to which the intervention of this symptom is a demonstration of the anxiety of division and the sign before runner of a psychotic decompensation on a paranoiac mode. To illustrate their comments, they present Amélie, age 27, met in a service of maternity. The study of this case allows declining the various functions that the hypochondria can take on: at once, symptom to try to maintain a social link (but which fails), defense mechanism to protect itself from the psychotic collapse, finally, the particular mode of the psychotic collapse, finally, the particular mode of constituent functioning of a systematized frenzy. What would have been able, during the first meeting with the young woman, to let think of a hysteria of conversion, phobias, infantile amnesia), finally revealed the existence of a melancholic nucleus, stretched out by the impossibility to admit the death of the father which took place in the fall of the Amélie's third pregnancy. It appears that this trauma played a dominating role in the decompensation of a puerperal psychosis on a paranoiac hillside and the nuclear structure of which would be the melancholy.
© 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Psychoanalysis; Maternity; Puerperal psychosis; Hypochondria; Paranoia; Melancholy; Clinical case

1. Introduction

L'hypocondrie se définit comme la croyance d'une atteinte organique en relation avec une modification même minime de la cénesthésie[1] normale ou ressentie péniblement pouvant aller jusqu'à la douleur. En général, les examens médicaux démontrent l'absence d'anomalie ou la disproportion entre les descriptions qu'en fait le malade et ce dont il souffre réellement. Freud

[1] « Malheureusement, pour beaucoup d'aliénistes l'idée de cénesthésie est extrêmement confuse. Ils confondent volontiers la perception cénesthésique avec les perceptions viscérales, avec les douleurs notamment plus ou moins nettement localisées à l'intérieur du corps : je rappelle que l'on doit entendre par perception cénesthésique le sentiment obscur et confus constitué à chaque moment de notre existence par l'ensemble des sensations provenant simultanément de tous les points de notre organisme. Ces sensations paraissent être surtout des sensations musculaires [. . .] la cénesthésie est le total des sensations venant de tous les points du corps à un moment donné, aussi bien de la peau que des organes les plus profondément situés. Elle s'oppose purement et simplement aux diverses perceptions particulières nettes et localisées fournies par les organes des sens. » [1].

Download English Version:

https://daneshyari.com/en/article/908542

Download Persian Version:

https://daneshyari.com/article/908542

Daneshyari.com