

CONSENSUC ET RPC

Recommandations pour la pratique clinique **Sortie précoce après accouchement : conditions pour proposer un retour précoce à domicile (mai 2004)**

Recommendations for clinical practice **Precocious leaving after delivery: conditions for proposing precocious homecoming (May 2004)**

Anaes

Service des recommandations professionnelles, Service évaluation économique, Anaes, 2, avenue du Stade de France, 93218 Saint-Denis La-Plaine cedex, Paris, France

Disponible sur internet le 14 mars 2005



Ces recommandations professionnelles ont été élaborées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (Anaes) à la demande de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes.

La méthode de travail a été celle décrite dans le guide des « Recommandations pour la pratique clinique, base méthodologique pour leur réalisation en France » publié par l'Anaes en 1999.

Les sociétés savantes dont les noms suivent ont été sollicitées pour l'élaboration de ces recommandations :

- la Société française de gynécologie ;
- la Société française de médecine périnatale ;
- le Regroupement national des sages-femmes occupant un poste d'encadrement ;
- l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes ;
- le Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
- Santé service ;
- le Collège national des généralistes enseignants.

L'ensemble du travail a été coordonné par le Dr Philippe Blanchard, chef de projet, sous la direction du Dr Patrice Dosquet, responsable du service des recommandations professionnelles, et par Mlle Anne-Isabelle Poullié, chef de projet, sous la direction de Mme Catherine Rumeau-Pichon, responsable du service évaluation économique.

La recherche documentaire a été effectuée par Mme Emmanuelle Blondet, documentaliste, sous la direction de Mme Rabia Bazi, responsable du service documentation. L'assistante documentaliste était Mme Laurence Frigère.

Le secrétariat a été assuré par Mme Catherine Solomon Alexander.

L'Anaes tient à remercier les membres du comité d'organisation, du groupe de travail, du groupe de lecture et de son conseil scientifique qui ont participé à ce travail.

COMITÉ D'ORGANISATION

Dr Joëlle Belaisch-Allart, gynécologue-obstétricien, Sèvres ; Mme Catherine Bertevas, sage-femme, Brest ; Pr Michel Collet, gynécologue-obstétricien, Brest ; Mme Eliza

Adresse e-mail : anaes@anaes.f (Anaes).

beth Lechevallier, sage-femme, Caen ; M. Benoît Le Goëdec, sage-femme, Paris ; Dr Bernard Maria, gynécologue-obstétricien, Paris ; Dr Murielle Mons, médecin coordonnateur, Puteaux ; Dr Michel Naiditch, médecin de santé publique, Paris ; Dr François Paré, médecin généraliste, Château-du-Loir Pr ; Jean-Christophe Rozé, pédiatre, Nantes

GRUPE DE TRAVAIL

Dr Michel Naiditch, médecin de santé publique, Paris, président du groupe de travail ; Mme Catherine Bertevras, sage-femme, Brest, chargée de projet ; Dr Philippe Blanchard, chef de projet, Anaes, Saint-Denis La Plaine ; Mlle Anne-Isabelle Poullié, chef de projet, Anaes, Saint-Denis La Plaine ; Dr Céline Baron, médecin généraliste, Angers ; Dr Jean-Philippe Bault, gynécologue-obstétricien, Les Mureaux ; Dr Christine Boissinot, pédiatre, Paris ; Mme Edith Brunet, sage-femme, Grenoble ; Dr Marianne Buhler, gynécologue, Paris ; Mme Danielle Capgras-Baberon, sage-femme, Nevers ; Dr Jean-Marie Cazauban, pédiatre, Périgueux ; Mme Martine Chouteau, infirmière puéricultrice, Chatou ; Dr Anne-Marie Dandres, médecin PMI, Gennevilliers ; Mme Anne Dusart, Collectif interassociatif autour de la naissance, Pagny-la-Ville ; Dr Joël Garcia, pédiatre, Saint-Nazaire ; Dr Françoise Gonnaud, pédopsychiatre, Lyon ; Pr Claude Lejeune, néonatalogiste, Colombes ; Dr Michel Le Poole, médecin-généraliste, Fontenay-le-Fleury ; Dr Olivier Louis, gynécologue-obstétricien, Libourne ; Mme Françoise Perez, sage-femme, Béziers ; Pr Christian Quereux, gynécologue-obstétricien, Reims ; Mme Muriel Terrieres, sage-femme, Montmorency

GRUPE DE LECTURE

Dr Gérard Andreotti, médecin-généraliste, La Crau ; Mlle Sylvaine Aubin, sage-femme, Caen ; Dr Dominique Aussel, gynécologue-obstétricien, Rennes ; Mme Isabelle Bar, sage-femme, Chateaubourg ; Dr Joëlle Belaisch-Allart, gynécologue-obstétricien, Sèvres ; Mme Elizabeth Blanchard, sage-femme, Bobigny ; Dr Yvon Bouchez, gynécologue-obstétricien, Rennes ; Mme Claire Bouet, sage-femme, Caen ; Pr Gérard Breart, épidémiologiste, Paris ; Mme Francine Caumel-Dauphin, sage-femme, Antony ; Pr Jean-Yves Chambonet, médecin-généraliste, Nantes ; Dr Patrick Chevallier, médecin généraliste, Maule ; Dr Evelyne Combié, médecin de santé publique, Le Kremlin-Bicêtre ; Mme Josette Delemarre, infirmière, Argenteuil ; Dr Catherine Dormard, médecin généraliste, Saclay ; Dr Alain Dreval, gynécologue, Strasbourg ; Mme Michèle Dugrais, sage-femme, Montfermeil ; Dr Philippe Eldelman, gynécologue, Paris ; Mme Marie-Laure Fleury, puéricultrice, Bouaye ; Dr Alicia Framarin, conseillère scientifique, Montréal ; Pr Jean-Robert Giraud, gynécologue-obstétricien, Angers ; Dr Dominique Girodet, pédiatre, Montmorency ; Mme Rolande

Grente, sage-femme, Caen ; Mme Isabelle Heudes-Guillon, sage-femme, Argenteuil ; Dr Françoise Lebrun, pédiatre, Paris ; Mme Elizabeth Lechevallier, sage femme, Caen ; Pr Pierre Lequien, pédiatre, Lille ; Mme Ghislaine Lhez-Hamieau, sage-femme, Saint-Leu-la-Forêt ; Dr Bernard Maria, gynécologue-obstétricien, Villeneuve-Saint-Georges ; Dr Muriel Mons, médecin coordonnateur, Puteaux ; Dr François Paré, médecin généraliste, Château-du-Loir ; Dr Régis Patte, médecin coordonnateur, Paris ; Dr Nathalie Pelletier-Fleury, chercheur, Le Kremlin-Bicêtre ; Pr Franck Perottin, gynécologue-obstétricien, Tours ; Mme Laurence Platel, sage-femme, Saint-Sébastien-sur-Loire ; Pr Jean-Christophe ROZÉ, pédiatre, Nantes ; Dr Jacques Schirrer, pédiatre, Besançon ; Pr Olivier Sibony, gynécologue-obstétricien, Paris ; Dr Thierry Six, gynécologue-obstétricien, Caen ; Dr Michèle Vial, pédiatre, Clamart

Recommandations

I. INTRODUCTION

I.1. Origine de la demande

Ce thème de travail a été retenu par le conseil scientifique de l'Anaes dans le cadre du programme d'élaboration des recommandations de pratique clinique, sur une proposition émanant de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes.

I.2. Cibles des recommandations

Les cibles des recommandations sont :

- les professionnels de santé : sages-femmes, gynécologues-obstétriciens et médicaux, pédiatres, omnipraticiens, puéricultrices, infirmières ;
- les structures et organismes : réseaux ville-hôpital, réseaux de proximité, hospitalisation à domicile, centres de PMI.

I.3. Contexte des recommandations

Le manque de professionnels et de places en maternité, les contraintes budgétaires et l'évolution de la demande des familles font que le retour précoce à domicile après accouchement (RPDA) peut selon les lieux et les structures de soins être une option, une nécessité ou un souhait. La France n'échappe pas à ces tendances. Les débats actuels sur la périnatalité et les modalités de sa prise en charge, qui sont le reflet des interrogations des professionnels et des usagers, concernent également le RPDA.

L'expérience des pays qui le pratiquent depuis de nombreuses années souligne que le RPDA est :

- sûr et potentiellement bénéfique s'il est soigneusement organisé, et choisi ou entièrement accepté ;

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/9328931>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/9328931>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)